

10. juni 2013

Vigtig information om medicintilskud

Bruger du lægemidler mod diabetes?

Fra den 11. november 2013 ændres tilskuddet til visse lægemidler mod diabetes. Nogle lægemidler får du ikke længere tilskud til, og andre får du fremover kun tilskud til, hvis din læge vurderer, at du opfylder visse betingelser (klausuleret tilskud). På bagsiden kan du se de lægemidler, der ændrer tilskud.

For de fleste lægemidler mod diabetes er der dog ingen tilskudsændringer.

Tal med din læge

Hvis dit lægemiddel står på bagsiden, skal du tale med din læge om din fremtidige behandling, så du fortsat kan få tilskud til din behandling. Det kan du fx gøre næste gang, du alligevel skal have fornyet din recept.

Tag gerne brevet med, når du skal til læge

Vi orienterer lægerne om ændringerne, men du kan også tage dette brev med til lægen.

Hvorfor ændrer Sundhedsstyrelsen tilskuddet?

Mange patienter vil kunne behandles med billigere lægemidler. Derfor får de dyrere lægemidler klausuleret tilskud, så de forbeholdes de patienter, som vil have særlig gavn af dem. Andre af lægemidlerne har fx flere bivirkninger og kan derfor med fordel erstattes af mere hensigtsmæssige lægemidler.

Få mere at vide

Du kan læse mere om ændringerne på vores hjemmeside, www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-diabetesmedicin.

Med venlig hilsen
Sundhedsstyrelsen

Lægemidler mod diabetes, der per 11. november 2013 ændrer tilskud

Hvis du er i behandling med et af nedenstående lægemidler, skal du inden den 11. november 2013 tale med din læge om din fremtidige behandling.

Disse lægemidler får generelt klausuleret tilskud:

Bydureon
Byetta
Lyxumia
Victoza

Lægen skal vurdere, om du er omfattet af den tilhørende klausul¹ for at kunne få tilskud. Hvis du er omfattet af klausulen, skal lægen skrive/angive ”tilskud” på din recept.

Disse lægemidler får ikke længere generelt tilskud:

Actos
Arcosal
Glucobay
Hexaglucon
Pioglitazon ”Orion”

¹ Tilskuddet er fremover klausuleret til:

Patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud, eller for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.