

Under Accutin® behandling

Selvom du anvender sikker prævention skal du have foretaget en graviditetstest en gang om måneden under hele behandlingen – samt 5 uger efter ophør af behandlingen.

Selvom du tror, at du ikke kan blive gravid, skal du alligevel bruge prævention, mens du er i behandling med Accutin®. (Dette gælder ikke, hvis du har fået fjernet livmoderen).


Du må ikke tage Accutin®, hvis du ammer, fordi det er sandsynligt, at Accutin® kan passere over i moder-mælken og videre til barnet.

Hvis du bliver gravid under Accutin® behandling

Hvis du bliver gravid, mens du tager Accutin®, skal du stoppe behandlingen og tage kontakt til lægen.

Hvis du bliver gravid i den første måned efter, at du er stoppet med behandlingen, skal du tage kontakt til lægen.

Accutin® (isotretinoin)



Information om behandling med Accutin® og graviditet

Page 1
Page nos are
not in the final
brochure

Accutin® og graviditet

Hvis du bliver gravid, under behandling med Accutin®, er der en meget stor risiko for foster-misdannelser – uanset hvilken dosis du tager og selv efter en kort behandlingsperiode.

Husk derfor:

**DU MÅ IKKE BLIVE GRAVID
MENS DU TAGER ACCUTIN®**

Og du skal være sikker på, at du ikke er gravid, når du starter behandlingen.

Inden opstart af Accutin® behandling

Du må ikke tage Accutin®, hvis du er gravid eller hvis der er mulighed for at du er blevet gravid.

Du skal anvende sikker prævention i mindst 1 måned før, du begynder at tage Accutin®, samt under hele behandlingsperioden og i 1 måned efter behandlingens afslutning.

Du skal have et negativt resultat fra en pålidelig graviditetstest før du starter behandlingen.

Du må først begynde behandlingen med Accutin® på 3. dagen af den første normale menstruationsperiode efter opstart af prævention.