

Pfizer/BioNTech-vaccine mod COVID-19

Nedenfor kan du læse mere om vaccinenes effekt, dens mulige bivirkninger, og hvad du skal være opmærksom på, efter du har modtaget vaccinen.



Vaccinen får immunsystemet til at danne antistoffer, der beskytter mod COVID-19



Forsøgene bag vaccinen viser, at den giver beskyttelse mod COVID-19 efter endt vaccination. Trods vaccination er der en lille risiko for at blive smittet med COVID-19, men skulle det ske, vil du som vaccineret typisk få et mildere forløb. Det er endnu uvist, hvor længe vaccinationen beskytter

Bivirkninger - fra almindelige til sjældne

Nedenfor kan du se de kendte bivirkninger ved vaccinen.

Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige og går over i løbet af et par dage. Her behøver du ikke kontakte en læge. Hvis du oplever alvorlige symptomer, bør du søge lægehjælp. **Bemærk, at der typisk er lidt flere bivirkninger efter andet stik.**

Meget almindelige bivirkninger (over 10%)

- Smerter på indstikssted
- Træthed
- Hovedpine
- Muskelsmerter og kulderystelser
- Ledsmarter
- Feber og hævelse på indstiksstedet
- Diarre

Almindelige bivirkninger (1-10%)

- Kvalme
- Rødme på indstiksstedet
- Opkastning


Ikke almindelige bivirkninger (0.1-1%)

- Søvnløshed
- Forstørrede lymfekirtler
- Armsmerter
- Utilpashed
- Kløe på indstiksstedet
- Overfølsomhedsreaktioner

Sjælden bivirkning (under 0.1%)

- Midlertidig lammelse i ansigtet

Meget almindelige bivirkninger (Oplevet af forsøgspersoner i procent)



Meget sjældne (op til 0.01%)

- Hjertemuskelbetændelse (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis)



I meget sjældne tilfælde kan du opleve en kraftig allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi.

Symptomerne på anafylaksi er:

Svimmelhed, ændret hjerterytme (puls), kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, hævede læber/ansigt/hals, nældefeber/udslæt, kvalme/opkastning, mavesmerter

Læs vaccinenes indlægsseddel på lmst.dk/covid19vacciner-pfizer