



Jcovden vaccine mod COVID-19

Nedenfor kan du læse mere om vaccinenes effekt, dens mulige bivirkninger, og hvad du skal være opmærksom på, efter du har modtaget vaccinen.



Vaccinen får immunsystemet til at danne antistoffer, der beskytter mod COVID-19



Forsøgene bag vaccinen viser, at den giver beskyttelse mod COVID-19 efter endt vaccination. Trods vaccination er der en lille risiko for at blive smittet med COVID-19, men skulle det ske, vil du som vaccineret typisk få et mildere forløb. Det er endnu uvist, hvor længe vaccinationen beskytter

Bivirkninger - fra almindelige til sjældne

Nedenfor kan du se de kendte bivirkninger ved vaccinen.

Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige og går over i løbet af et par dage. Her behøver du ikke kontakte en læge. Hvis du oplever alvorlige symptomer, bør du søge lægehjælp.

Meget almindelige bivirkninger (over 10%)

- Smerter på indstikssted
- Hovedpine
- Træthed
- Muskelømhed
- Kvalme

Almindelige bivirkninger (1-10%)

- Feber
- Hoste
- Ledsmerter
- Rødt udslæt og hævelse på indstiksstedet
- Kulderystelser

Ikke almindelige bivirkninger (0.1-1%)

- Rysten
- Nysen
- Smerter i arme og ben
- Ondt i halsen
- Udslæt
- Diarré
- Kraftig svedtendens
- Muskelsvaghed
- Rygsmerter
- Afkræftethed
- Utilpashed
- Føleforstyrrelser i huden


Sjældne bivirkning (under 0.1%)

- Overfølsomhed
- Nældefeber
- Allergisk reaktion i hud og væv
- Hævede lymfekirtler
- Tinnitus
- Opkastning
- Nedsat følesans i huden

Meget sjældne (op til 0.01%)

- Blodpropper, ofte på usædvanlige steder (f.eks. hjerne, tarm, lever, milt), i kombination med lavt niveau af blodplader. Dette sjældne fænomen omtales jævnligt som VITT.
- Guillain-Barré Syndrom (GBS)

Meget almindelige bivirkninger (Oplevet af forsøgspersoner i procent)



Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du inden for 3 uger efter vaccinationen udvikler nogen af følgende symptomer: svære eller vedvarende hovedpineanfald, sløret syn, ændret mentaltilstand eller krampeanfald, åndenød, brystmerter, hævede ben, smerter i ben eller vedvarende mavesmerter, usædvanlige hudblødninger eller punktformede, runde pletter andre steder end der, hvor du blev vaccineret.



I meget sjældne tilfælde kan du opleve en kraftig allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi.

Symptomerne på anafylaksi er:

Svimmelhed, ændret hjerterytme (puls), kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, hævede læber/ansigt/hals, nældefeber/udslæt, kvalme/opkastning, mavesmerter

Læs vaccinenes indlægsseddel på lmst.dk/covid19vacciner-jcovden