



# AstraZenecas COVID-19-vaccine

Nedenfor kan du læse mere om vaccinenes effekt, dens mulige bivirkninger, og hvad du skal være opmærksom på, efter du har modtaget vaccinen.



Vaccinen får immunsystemet til at danne antistoffer, der beskytter mod COVID-19



Forsøgene bag vaccinen viser, at den giver beskyttelse mod COVID-19 efter endt vaccination. Trods vaccination er der en lille risiko for at blive smittet med COVID-19, men skulle det ske, vil du som vaccineret typisk få et mildere forløb. Det er endnu uvist, hvor længe vaccinationen beskytter

## Bivirkninger - fra almindelige til sjældne

Nedenfor kan du se de kendte bivirkninger ved vaccinen.

Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige og går over i løbet af et par dage. Her behøver du ikke kontakte en læge. Hvis du oplever alvorlige symptomer, bør du søge lægehjælp. **Bemærk, at der typisk er lidt flere bivirkninger efter første stik.**

### Meget almindelige bivirkninger (over 10%)

- Ømhed, smerte, varme, kløe eller blå mærker på indstiksstedet
- Træthed
- Hovedpine
- Utilpashed
- Muskelømhed
- Feber
- Kulderystelser
- Ledsmerter
- Kvalme


### Almindelige bivirkninger (1-10%)

- Rødme på indstiksstedet
- Hævelse på indstiksstedet
- Opkastning
- Diarré
- Feber (over 38 grader)
- Lavt niveau af blodplader

### Ikke almindelige bivirkninger (0.1-1%)

- Nedsat appetit
- Forstørrede lymfekirtler
- Svimmelhed
- Øget svedproduktion
- Døsighed
- Kløe
- Udslæt

### Meget almindelige bivirkninger (Oplevet af forsøgspersoner i procent)



### Meget sjældne (op til 0.01%)

- Blodpropper, ofte på usædvanlige steder (f.eks. hjerne, tarm, lever, milt), i kombination med lavt niveau af blodplader. Dette sjældne fænomen omtales jævnligt som VITT.
- Guillain-Barré Syndrom (GBS)



Søg straks lægehjælp, hvis du inden for tre uger efter vaccinationen får nogen af følgende symptomer: kraftig eller vedvarende hovedpine, sløret syn, forvirring eller krampeanfald, åndenød, smerter i brystet, hævede ben, smerter i benene eller vedvarende mavesmerter, usædvanlige blå mærker på huden eller små runde pletter ud over på det sted, hvor vaccinationen blev givet.



I meget sjældne tilfælde kan du opleve overfølsomhed eller en kraftig allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi. Symptomerne på anafylaksi er:

Svimmelhed, ændret hjerterytme (puls), kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, hævede læber/ansigt/hals, nældefeber/udslæt, kvalme/opkastning, mavesmerter