

Den 11. august 2016
Sagsnr: 2016020138

Forslag til indstilling

Revurdering af tilskudsstatus for anæstetika

Baggrund

Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnet om at revurdere tilskudsstatus for anæstetika i ATC-gruppe N01, ekskl. N01BB02, lidokain medicinsk plaster og N01BX04, capsaicin medicinsk plaster. **Bilag A** er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne.

Denne indstilling omfatter alle lægemidler i ATC-gruppe N01 (ekskl. N01BB02, lidokain medicinsk plaster og N01BX04, capsaicin medicinsk plaster), der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 9. august 2016.

Vores indstilling omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler.

Bilag B er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene 2013-2015.

Indstilling til fremtidig tilskudsstatus

Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen:

1. Lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

isofluran (N01AB06)
desfluran (N01AB07)
sevofluran (N01AB08)
thiopental (N01AF03)
fentanyl (N01AH01)
alfentanil (N01AH02)
sufentanil (N01AH03)
remifentanil (N01AH06)
propofol (N01AX10)
dinitrogenoxid (N01AX13)
esketamin (N01AX14)
dinitrogenoxid, komb. (N01AX63)

bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud.

2.

Lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

bupivacain (N01BB01)
lidocain (N01BB02) injektionsvæske
mepivacain (N01BB03)
ropivacain (N01BB09)
bupivacain + adrenalin (N01BB51)
lidocain + adrenalin (N01BB52, injektionsvæske)
mepivacain + adrenalin (N01BB53)
prilocain + felypressin (N01BB54)
articain + adrenalin (N01BB58)

bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud.

3.

Lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

lidocain (N01BB02) gel og kutanspray
lidocain + prilocain (N01BB20)
lidocain + tetracain/chlorhexidin (N01BB52, gel og creme)

bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud.

Revurderingsforløb

Den 17. december 2015 orienterede Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside¹ om, at de ville indlede revurdering af tilskudsstatus for bl.a. bedøvelsesmidler.

Lægemiddelstyrelsen orienterede ligeledes de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om denne revurdering af tilskudsstatus.

Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møde den 14. juni 2016.

Begrundelse

Ad 1.

Der er tale om generelle anæstetika, der findes som bl.a. injektionsvæske, væske til inhalationsdamp eller medicinsk gas. De anvendes primært i forbindelse med universel anæstesi, og ganske få personer indløser recept årligt. Disse lægemidler anvendes primært på sygehusene eller i nogle tilfælde i speciallægepraksis. På denne baggrund mener vi fortsat ikke, at disse lægemidler bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Ad 2.

Der er tale om lokalanæstetika, der findes som injektionsvæsker. Disse lægemidler anvendes primært på sygehusene, i speciallægepraksis/almen praksis og tandlægepraksis. Ganske få personer indløser recept

¹ <http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/medicintilskudsnaevnet-starter-revurdering-af-tilskudsstatus-for-medicin-i-resten-af-atc-gruppe-n>

årligt. På denne baggrund mener vi fortsat ikke, at disse lægemidler bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Ad 3.

Der er tale om lokalanæstetika, der findes som bl.a. creme, gel eller plaster. De anvendes til overfladeanalgesi i forskellige situationer. Nogle af lægemidlerne er i håndkøb, og af dem er der en del håndkøbsalg.

En del af lægemidlerne anvendes i høj grad på sygehusene, i speciallægepraksis/almen praksis og i tandlægepraksis i forbindelse med forskellige undersøgelser, injektioner m.m. Vi mener, at en stor del af salget i primærsektoren er til formål, hvortil der ikke med rimelighed kan forventes tilskud fra Regionsrådet. De anvendes således til lokalbedøvelse før enkeltstående tilfælde af blodprøvetagning eller injektioner/vaccinationer af børn. Anvendelsesområdet er endvidere hudkløe, solskoldning, insektstik og lignende, småår før rensning, hæmorider og analfissurer (1).

Afsluttende bemærkninger

Med denne indstilling lægger vi ikke op til, at der bør ske ændringer i tilskudsstatus for anæstetika. Vi mener fortsat, at lægemidlerne ikke bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

På nævnets vegne




Palle Mark Christensen
Formand

Bilag

- A. Grafisk oversigt af 11. august 2016 over ATC-gruppe N01.
- B. Oversigt af 11. august 2016 over anæstetika i ATC-gruppe N01 med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene 2013-2015.

Referencer

1. Dansk Lægemiddel Information A/S. pro.medicin.dk. Lokalbedøvende hudmidler. Revideret 17.11.2015. <http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/grupper/118000>



Oversigt over anæstetika i ATC-gruppe N01

Læsevejledning til skemaerne nedenfor

Lægemidler: Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for anæstetika i ATC-gruppe N01, ekskl. lidokain medicinsk plaster (N01BB02) og capsaicin medicinsk plaster (N01BX04), da de bliver revurderet sammen med lægemidler mod neuropatiske smerter.

Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 9. august 2016.

Godkendt indikation: Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeeer for de enkelte lægemidler¹. Der kan være tale om en sammenskrivning.

Udleveringsgruppe: Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper "A", "B" etc. fremgår af § 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 1671 af den 12. december 2013².

Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

Forbrug: Antallet af personer i behandling er fra lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk, og omfatter patienter i primærsektoren.

N01A, Anæstetika, generelle

N01AB: Halogenerede kulbrinter

N01AB06	ISOFLURAN
Lægemidler	Isofluran "Baxter" væske til inhalationsdamp
Godkendt indikation	Universel anæstesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: 1 2015: -

N01AB07	DESFLURAN
Lægemidler	Suprane væske til inhalationsdamp
Godkendt indikation	Universel anæstesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: - 2015: -

¹ <http://www.produktresume.dk>

² <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160842>

N01AB08	SEVOFLURAN
Lægemidler	Sevofluran "Baxter" væske til inhalationsdamp Sevorane væske til inhalationsdamp
Godkendt indikation	Universel anæstesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: - 2015: -

N01AF: Barbiturater, usammensatte

N01AF03	THIOPENTAL
Lægemidler	Pentocur pulver til injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Intravenøs anæstesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: - 2015: -

N01AH: Opioid-anæstetika

N01AH01	FENTANYL
Lægemidler	Fentanyl "B. Braun" injektionsvæske, opløsning Fentanyl "Hameln" injektionsvæske, opløsning Haldid injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Fentanyl er et kortvirkende opioid, som anvendes: <ul style="list-style-type: none"> • til kombinationsanæstesi og –analgesi • som analgetisk komponent til universel anæstesi under respirationsbehandling • som analgetikum til patienter i respirator
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 12 2014: 11 2015: 18

N01AH02	ALFENTANIL
Lægemidler	Rapifen injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Voksne: kombinationsanæstesi og – analgesi. Til anvendelse hos nyfødte, spædbørn, børn og unge under 18 år som: <ul style="list-style-type: none"> • et opioidt analgetikum sammen med et hypnotikum til induktion af anæstesi • et opioidt analgetikum i forbindelse med generel anæstesi under

	såvel kortvarige som langvarige kirurgiske indgreb.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 1 2014: 3 2015: 1

N01AH03	SUFENTANIL
Lægemidler	Sufenta injektionsvæske, opløsning Sufentanil "Hameln" injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Voksne <ul style="list-style-type: none"> • Kombinationsanæstesi og -analgesi. • Epidural analgesi ved behandling af postoperative smerter. • Analgetisk supplement til epidural bupivacain ved forløsning. Pædiatrisk population <ul style="list-style-type: none"> • Intravenøs sufentanil er indiceret som analgetikum til anvendelse under induktion og/eller vedligeholdelse af balanceret universel anæstesi hos børn over 1 måned. • Epiduralt sufentanil er indiceret til anvendelse hos børn over 1 år til postoperativ smertebehandling efter abdominal-kirurgi thorax- eller ortopædkirurgi.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 7 2014: 1 2015: 3

N01AH06	REMIFENTANIL
Lægemidler	Remifentanil "B. Braun" pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning Remifentanil "Teva" pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning Ultiva pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Remifentanil er indiceret som et analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Remifentanil er indiceret som analgetikum til mekanisk ventilerede patienter, der er i intensiv behandling og er 18 år eller ældre.
Udleveringsgruppe	AP4NB
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 1 2014: 1 2015: 3

N01AX: Andre generelle anæstetika

N01AX10	PROPOFOL
Lægemidler	Diprivan injektionsvæske, emulsion Propofol "B. Braun" injektions-/infusionsvæske, emulsion Propolipid injektions-/infusionsvæske, emulsion
Godkendt indikation	<i>10 mg/ml</i> Et kortvirkende, intravenøst, generelt anæstetikum til: <ul style="list-style-type: none"> • induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi hos voksne samt børn over 1 måned. • sedering under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i tillæg til lokal eller regional anæstesi hos voksne samt børn over 1 måned. • sedering af ventilerede patienter over 16 år under intensiv behandling. <i>20 mg/ml</i> Et kortvirkende, intravenøst, generelt anæstetikum til: <ul style="list-style-type: none"> • induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi hos voksne samt børn over 3 år. • sedering under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i tillæg til lokal eller regional anæstesi hos voksne samt børn over 3 år. • sedering af ventilerede patienter over 16 år under intensiv behandling.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 4 2014: 4 2015: 6

N01AX13	DINITROGENOXID
Lægemidler	Medicinsk Dinitrogenoxid "Air Liquide" 100 % medicinsk gas, flydende Medicinsk Dinitrogenoxid "Strandmøllen" medicinsk gas, flydende Medicinsk dinitrogenoxid "Yara Praxair" 100 % medicinsk gas, flydende Niontix medicinsk gas, flydende
Godkendt indikation	Dinitrogenoxid anvendes <ul style="list-style-type: none"> • til anæstesi i kombination med andre inhalationsanæstetika eller intravenøse anæstetika. • til analgesi/sedation i alle situationer, hvor en hurtig indtrædelse og afbrydelse af smertelindring/sedation er ønskelig.
Udleveringsgruppe	GH
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: - 2015: -

N01AX14	ESKETAMIN
Lægemidler	S-ketamin "Pfizer" injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	<ul style="list-style-type: none"> • Induktion og opretholdelse af universel anæstesi (narkose), som eneste anæstetikum eller kombineret med andet anæstesimiddel. • Supplement ved regional eller lokal anæstesi. • Anæstesi og smertelindring i akutte medicinske situationer.
Udleveringsgruppe	AP4NB
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 38 2014: 29 2015: 33

N01AX63	DINITROGENOXID, KOMB.
Lægemidler	Kalinox medicinsk gas, komprimeret Latox medicinsk gas, komprimeret Livopan medicinsk gas, komprimeret Medimix medicinsk gas, komprimeret
Godkendt indikation	Til behandling af kortvarig smerte af mild til moderat styrke, når der er brug for hurtig iværksættelse og afbrydelse af behandlingen. Det kan bruges til behandling af patienter i alle aldre undtagen til børn under 1 måned.
Udleveringsgruppe	GH
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: ? 2014: ? 2015: ?

N01B, Lokalanæstetika

N01BB: Amider

N01BB01	BUPIVACAIN
Lægemidler	Marcain injektionsvæske, opløsning Marcaine injektionsvæske, opløsning Marcain Heavy injektionsvæske, opløsning Marcain Spinal injektionsvæske, opløsning Marcain Spinal Tung injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	<p><i>Injektionsvæske, opløsning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lednings- og infiltrationsanalgesi. Epidural analgesi. • Anæstesi til kirurgi til voksne og børn over 12 år. • Akut smertekontrol til voksne, spædbørn og børn over 1 år <p><i>Spinal injektionsvæske, opløsning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spinalanalgesi. • Intratekal (subarachnoid, spinal) anæstesi ved kirurgiske og obstetriske indgreb. • Ved operation på nedre ekstremiteter, inklusive hofteoperation, som varer 1,5-4 timer.

	<p><i>Spinal tung injektionsvæske, opløsning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spinalanalgesi. • Intratekal (subarachnoid, spinal) anæstesi ved kirurgiske og obstetriske indgreb. • Ved operation i nedre abdomen (inklusive kejsersnit), ved urologiske indgreb og indgreb i nedre ekstremiteter, inklusive hofteoperation, som varer 1,5-3 timer.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 13 2014: 14 2015: 11

N01BB02	LIDOCAIN
Lægemidler	Lidokain "FarmaPlus" injektionsvæske, opløsning Xylocain gel Xylocain injektionsvæske, opløsning Xylocain kutanspray, opløsning Xylocaine kutanspray, opløsning
Godkendt indikation	<p><i>Injektionsæske</i></p> <p>Nerveblokade i fingrene, tæerne, ørerne, næsen eller penis. Infiltrationsanæstesi og perifer nerveblokade når adrenalin er kontraindiceret.</p> <p><i>Gel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Overfladeanalgesi ved endoskopiske undersøgelser. <ul style="list-style-type: none"> - Cystoskopi, kateterisation, sonde-undersøgelser og andre intraurethrale procedurer hos mænd og kvinder. - I nasale og pharyngeale hulrum i forbindelse med endoskopiske procedurer som gastroskopi og bronchoskopi. - Under proctoskopi og rektoskopi. - Tracheal intubation. • Symptom-behandling af smerter i forbindelse med cystitis og urethritis. • For at lindre smerter efter omskæring af drenge. • Xylocain gel er indiceret til voksne og børn i alle aldre <p><i>Kutanspray</i></p> <p>Overfladeanalgesi. Xylocaine kutanspray, opløsning, er indiceret til voksne og børn ≥ 2 år.</p>
Udleveringsgruppe	Xylocain gel: HF De øvrige: B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 4.482 2014: 4.370 2015: 4.348

N01BB03	MEPIVACAIN
Lægemidler	Carbocain injektionsvæske, opløsning Scandonest injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Lednings- og infiltrationsanalgesi. Epidural analgesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 12 2014: 8 2015: 10

N01BB09	ROPIVACAIN
Lægemidler	Naropin infusionsvæske, opløsning Naropin injektionsvæske, opløsning Ropivacain "B. Braun" injektions-/infusionsvæske, opløsning Ropivacain "B. Braun" injektionsvæske, opløsning Ropivacain "Fresenius Kabi" infusionsvæske, opløsning Ropivacain "Fresenius Kabi" injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	<p><i>7,5 mg/ml og 10 mg/ml</i> Til voksne og unge over 12 år til anæstesi i forbindelse med kirurgisk indgreb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epidural blokade ved operation, herunder kejsersnit. • Større nerveblokader. • Perifer nerveblokade og infiltrationsanæstesi. <p><i>5 mg/ml</i> Intratekal administration ved kirurgisk anæstesi.</p> <p><i>2 mg/ml</i> Akut smertelindring: Til voksne og unge over 12 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig epidural infusion eller intermitterende bolusadministration ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler • Perifer nerveblokade og infiltrationsblokader • Kontinuerlig infusion eller intermitterende bolus-administration ved kontinuerlig perifer nerveblokade f.eks. postoperativ smertelindring <p>Til børn fra 1-12 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkel og kontinuerlig perifer nerveblokade <p>Til nyfødte, spædbørn og børn til og med 12 år (præ- og postoperativt):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaudal epidural blokade • Kontinuerlig epidural infusion
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud

Forbrug (antal personer i behandling)	2013: - 2014: 2 2015: -
---	-------------------------------

N01BB20	KOMBINATIONER
Lægemidler	Emla creme Emla medicinsk plaster Oraqix periodontalgel Tapin creme Tapin medicinsk plaster
Godkendt indikation	<p><i>Creme</i> Voksne: Overfladeanalgesi af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huden i forbindelse med <ul style="list-style-type: none"> - indstik af kanyler, f.eks. venekatetre eller blodprøvetagning - overfladekirurgi • genital mucosa, f.eks. før overfladiske kirurgiske indgreb eller infiltrationsanalgesi • bensår for at lette mekanisk rensning/debridering <p>Børn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyfødte i alderen 0-2 måneder, spædbørn i alderen 3-11 måneder og børn i alderen 1-11 år til overfladeanalgesi af huden i forbindelse med indstik af kanyler, f.eks. venekatetre eller blodprøvetagning, samt før overfladiske kirurgiske indgreb. • børn med atopisk dermatit før afskrabning af molluskler. <p><i>Medicinsk plaster</i> Overfladeanalgesi</p> <p><i>Periodontalgel</i> Til anvendelse på voksne med henblik på lokalanæstesi i de parodontale pocher i forbindelse med diagnostiske procedurer og behandlinger såsom dybdemåling, tandrensning og/eller rodrensning.</p>
Udleveringsgruppe	Periodontalgel: B De øvrige: HF
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 1.786 2014: 1.886 2015: 1.967

N01BB51	BUPIVACAIN, KOMBINATIONER
Lægemidler	Marcain-adrenalin injektionsvæske
Godkendt indikation	<p>Lednings- og infiltrationsanalgesi. 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anæstesi til kirurgi til voksne og børn over 12 år. • Akut smertekontrol til voksne, spædbørn og børn over 1 år

	5,0 mg/ml + 5 mikrogram/ml <ul style="list-style-type: none"> • Anæstesi til kirurgi til voksne og børn over 12 år. • Akut smertekontrol til voksne og børn over 12 år.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 2 2014: 2 2015:

N01BB52	LIDOCAIN, KOMBINATIONER
Lægemidler	Instillagel gel Lidoplyin Dental Adrenalin injektionsvæske, opløsning Pliapel creme Xion injektionsvæske, opløsning Xylocain-adrenalin injektionsvæske, opløsning Xyloplyin Dental Adrenalin injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	<i>Gel</i> Overfladeanalgesi ved endoskopiske undersøgelser. <i>Creme</i> Er indiceret til voksne som lokal overfladeanalgesi på intakt hud forud for dermatologiske procedurer. <i>Dental injektionsvæske</i> Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb af længere varighed. <i>Injektionsvæske</i> Lednings- og infiltrationsanalgesi. Xylocain-adrenalin Ukonservet er indiceret til voksne og børn over 1 år.
Udleveringsgruppe	Gel: HF De øvrige: B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 234 2014: 252 2015: 255

N01BB53	MEPIVACAIN, KOMBINATIONER
Lægemidler	Carbocain-adrenalin injektionsvæske Scandonest-Adrenalin injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Lednings- og infiltrationsanalgesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 5 2014: 10 2015: 7

N01BB54	PRILOCAIN, KOMBINATIONER
Lægemidler	Citanest Dental Octapressin injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Lednings- og infiltrationsanalgesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 9 2014: 7 2015: 8

N01BB58	ARTICAIN, KOMBINATIONER
Lægemidler	Dentocaine injektionsvæske, opløsning Septanest injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte Septocaine injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte Ubistesin injektionsvæske, opløsning Ubistesin Forte injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	<i>Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte</i> Lednings- og infiltrationsanalgesi. <i>Injektionsvæske, opløsning</i> Lokalanalgesi (infiltrations- og nerveblokadeanalgesi) inden for tandplejen. Beregnet til brug hos voksne og børn over 4 år. Ubistesin Forte og Dentocaine 40/0,01 mg/ml er specielt indiceret ved komplicerede indgreb, der kræver forlænget analgesi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 13 2014: 17 2015: 14