



- vi er til for dig

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

28 FEB. 2013

Dato: 25. februar 2013

Sagsnummer:
Initialer: AZ

Vedrørende ansøgning om enkelttilskud til Palexia depot

Anæstesiologisk Afdeling
Regionalt Smertecenter
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf.: 47 32 63 70
E-mail:
Afd.fax: 47 32 63 78

Direkte tlf.:
E-mail:

www.regionsjælland.dk

Vi står i en meget svær situation, idet vi har rigtig mange patienter i specielt Palexia depot behandling, som vi skal søge enkelttilskud til. Som I er bekendt med, er de patienter, som bliver visiteret til en smerteklinik, i princippet komplekse patienter. Det betyder at de har prøvet forskellige former for medicinsk behandling inkl. Opioid behandling, inden de kommer hos os. Som regel har der enten været bivirkninger eller utilstrækkelig effekt i de doser at opioider, som de har fået. Vi indleder altid opioidbehandling med Morfin, med mindre patienterne har prøvet Morfin i forvejen.

Vi kan ikke være sikre på, hvilke doser og hvor lang tid de har fået Morfinen, som ofte er givet af egen læge, og hvor vi ikke har oplysninger om dosis og behandlingsvarighed.

Fra Region Sjælland har vi også indtil for nylig fået besked på, at vi skal undgå at bruge Oxycodon, hvilket vi naturligvis har rettet os efter, hvorfor patienten ikke naturligt får Oxycodon som andet valg.

Metadon bliver prøvet men primært hos patienter som vi har mistanke om har central sensibilisering. Metadon er jo et opioid, som kan være svært at styre, specielt i starten af behandlingen.

Vi har erfaring med, at en del patienter som får opioider, når de overgår til Palexia bliver kognitivt betydeligt bedre fungerende, og samtidig er der indimellem også rigtig god effekt på smerter, som ellers har været intraktable på Morfin.

For at imødegå at vi ikke får for mange afslag på ansøgning, har vi seponeret Palexia på enkelte patienter og startet behandling med anden opioid. Fra at være velfungerende har vi haft eksempler på patienter, der er blevet konfuse og har fået bivirkninger.

Man kan selvfølgelig hævde at vi skulle have startet ansøgningen om tilskud til opioider for lang tid siden, men vi har også fået af vide, at man ikke var klar til at modtage ansøgninger indtil for kort tid siden. Vi havde ikke regnet med, at der ville komme så mange afslag på tilskud og vi står derfor i den situation, at mange patienter ikke vil kunne fortsætte med Palexia-behandling, idet de ikke har råd til at betale for medicinen.


Forslag:


Vi beder om, at man slår en streg i sandet, og hvis patienterne har været igennem Morfin-behandling og har fået bivirkninger, giver tilskud til Palexia.

Fremover vil patienterne både skulle igennem Morfin og OxyContin-behandling for at blive sat i Palexia-behandling.

Vi synes selvfølgelig, at det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at patienterne får den billigste medicin.

Venlig hilsen


Asbjørn Ziebell
Overlæge


Torsten Jonsson
overlæge