

TILLÆG 1

Advarsel



Nogle patienter er specielt sårbare over for ophobning af for meget væske i bughulen, som kan være forbundet med dialysebehandlingen. Disse patienter omfatter nyfødte, spædbørn og små børn samt alle patienter med særlig hjerte- eller lungesygd.

- På grund af deres størrelse kan nyfødte, spædbørn og små børn udvise svære symptomer ved ophobning af små mængder væske i bughulen.
- Enhver patient med særlig hjerte- eller lungesygd kan, uanset alder, også udvise svære symptomer ved ophobning af tilsyneladende små mængder væske i bughulen.

Symptomer, der bør advare patienten eller sundhedspersonalet om, at for meget væske kan have ophobet sig, kan være specifikke for patientens alder og udviklingsniveau som beskrevet nedenfor:

- Nyfødte/spædbørn: Generelle tegn på utilpashed (f.eks. uro, gråd), bleghed eller blålig hudfarve, vejrtrækningsbesvær, spisevægring, oppustet mave eller vedvarende opkastninger.
- Små børn: Klage over mæthed/sornemelse eller mavepine, vedvarende gråd, vejrtrækningsbesvær, spisevægring, oppustet mave eller vedvarende opkastninger.
- Patienter med hjerte-kar- eller lungesygd: Vejrtrækningsbesvær, skulder- og/eller brystmerter, bleghed eller blålig hudfarve.

Hvis der er mistanke om overfyldning (IIPV), skal du gøre følgende:

1. Tryk omgående på STOP, tryk derefter på [Pil ned], og start et manuelt dræn. Dræn væsken helt væk fra bughulen.
2. Kontakt din dialysesygeplejerske eller Baxters tekniske service for at få assistance til udførelsen af trin 1.
3. Efter udførelse af trin 1 skal du omgående kontakte nefrologen i tilfælde af ENHVER form for ubehag eller symptomer på overfyldning af bughulen (IIPV), inklusive men ikke begrænset til de symptomer, der er anført ovenfor.
4. Hvis du ikke kan komme i kontakt med dialyseafdelingen, nefrologen eller Baxters tekniske service, og hvis du eller patienten oplever symptomer på overfyldning af bughulen (IIPV), skal du omgående ringe 112 eller til vagtlægen eller henvende dig på nærmeste skadestue.