

Donepezil – Risk of neuroleptic malignant syndrome

Produktresumé, pkt 4.4:

Maligt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Det er rapporteret at maligt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på maligt neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske manifestationer af maligt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Produktresumé, pkt 4.8 (under Nervesystemet)

Maligt neuroleptikasyndrom

Indlægseddél, afsnit 4 (under alvorlige bivirkninger)

Kontakt straks lægen, hvis du får feber med muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en lidelse kaldet "maligt neuroleptikasyndrom"), da akut behandling kan være nødvendig.