

## **PhVWP/CMD(h) vedtaget SPC og PIL ordlyd for valproat med hensyn til interaktion med carbapenemer**

### **SPC**

#### **Pkt. 4.4: Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen**

Samtidig brug af valproat/natriumvalproat og præparater indeholdende carbapenemer anbefales ikke (se pkt. 4.5).

#### **Pkt. 4.5: Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion**

Fald i koncentrationen af valproat i blodet er blevet rapporteret, når det administreres sammen med carbapenemer og resulterer i 60-100 % fald i valproatniveauet efter omkring 2 dage. På grund af det hurtige og kraftige fald, mener man ikke, at det er muligt at styre samtidig behandling med carbapenemer hos patienter, der er stabiliseret med valproat. Kombinationen bør derfor undgås (se pkt. 4.4).

### **PIL**

#### **Afsnit 2: Brug af anden medicin**

Fortæl det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin:

Medicin, der indeholder carbapenemer (antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat og carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.