

MEDICINTILSKUDSNÆVNET

SEKRETARIATET
Tlf. 44 88 95 95
AXEL HEIDES GADE 1
2300 KØBENHAVN S

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Den 14. april 2009

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06, laksantia, og magnesiumhydroxid (A02AA04)

Baggrund og indhold

Lægemiddelstyrelsen har som led i revurderingsprocessen anmodet Medicintilskudsrådet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06, laksantia. Rådet har fundet det hensigtsmæssigt samtidig at foretage revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A02AA04, magnesiumforbindelser, da disse lægemidler også anvendes mod obstipation. **Bilag A** er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne.

Nedenfor følger først Medicintilskudsrådets indstilling til lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus. Derefter følger en gennemgang af revurderingsforløbet, oplysninger om anvendelse og forbrug og endelig rådets bemærkninger og begrundelser i relation til lægemidlerne og indstillingen.

Bilag B er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af den godkendte indikation for det lægemiddel med indhold af det pågældende stof, der har været godkendt længst, lægemiddelnavne, lægemiddelformer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus, forbrug og priser for de lægemidler, for hvilke, der er anmeldt en pris til Lægemiddelstyrelsen og oplysninger om enkelttilskud. Langt hovedparten af lægemidlerne har udleveringsstatus HF og er derfor ikke begrænset til salg fra apotek. Virksomhederne har derfor ikke pligt til at indberette en pris for disse lægemidler til Lægemiddelstyrelsen - priserne fastsættes lokalt af distributøren.

Medicintilskudsrådets indstilling

Medicintilskudsrådet indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen:

1.

Perorale og rektale lægemidler i ATC-gruppe A06 (laksantia) med indhold af

enkeltstofferne: bisacodyl (A06AB02),
natriumpicosulfat (A06AB08),
ispaghula (A06AC01),
magnesiumoxid (A06AD02),
laktulose (A06AD11),
lactitol (A06AD12),
natriumphosphat (A06AG01),
bisacodyl (A06AG02) og
glycerol (A06AX01)

kombinationerne: macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid (A06AD65),
ascorbinsyre, natriumascorbat, macrogol 3350, natriumsulfat, natriumchlorid og kaliumchlorid (A06AD),
dinatriumphosphatdodecahydrat og natriumdihydrogenphosphatdihydrat (A06AD),
natriumdocusat i kombination med glycerol eller sorbitol (A06AG10), og
laurilsulfat og natriumcitrat (A06AG11)

bevarer gældende tilskudsstatus (ikke generelt tilskud).

2.

Lægemidler til injektion i ATC-gruppe A06 (laksantia) med indhold af:

enkeltstoffet: methylnaltrexon

bevarer gældende tilskudsstatus (ikke generelt tilskud).

3.

Samtlige lægemidler i ATC-gruppe A02AA04 (magnesiumforbindelser) med indhold af

enkeltstoffet: magnesiumhydroxid (A02AA04)

bevarer gældende tilskudsstatus (ikke generelt tilskud).

Revurderingsforløb

Lægemiddelstyrelsen orienterede i brev af 13. juni 2005 samtlige virksomheder med markedsføringstilladelse til humane lægemidler¹ om, at man ville indlede revurderingsprocessen med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler i ATC-grupperne A, C og J. Den 29. november 2006 orienterede Lægemiddelstyrelsen om, at man i starten af 2007 ville begynde revurderingen af ATC-gruppe A (fordøjelsesorganer og stofskifte) bl.a. omfattende A06 (laksantia).

¹ Med undtagelse af virksomheder med markedsføringstilladelse til lægemidler med begrænset udlevering, naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater og radioaktive lægemidler.

Medicintilskudsnettet har drøftet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06 (laksantia) og A02AA04 (magnesiumforbindelser) på sine møder den 20. november 2007 og den 17. marts 2009.

Anbefalet anvendelse og forbrug

Laksantia kan inddeles i volumenforøgende, osmotisk virkende, reflektorisk virkende og lokalt virkende. IRF skriver således om laksantia i sin Nationale Rekommandationsliste²:

”Evidensen på området er sparsom. Kostomlægning, væske, motion og fornuftige defæktionsvaner er primære tiltag. Ved behov for laksantia (fx hos ældre sengeliggende patienter og patienter i morfikabehandling) anbefales generelt osmotisk virkende laksantia, hvor magnesiumoxid er 1. valg. Laktulose og makrogolbaserede elektrolytopløsninger kan anvendes, hvis patienten ikke kan indtage tabletter, ved nedsat nyrefunktion eller ved samtidig behandling med lægemidler med interaktionsrisiko (fx digoxin).

Langvarig brug af specielt de reflektorisk virkende laksantia frarådes, men ved behov er bisacodyl tabletter 1. valg.

.....

Den evidensbaserede viden på området er yderst sparsom. Ved de få randomiserede undersøgelser er det ofte uklart, hvordan obstipation er defineret, og patientpopulationerne er heterogene. Patienternes behov varierer meget, men langvarig brug af reflektorisk virkende midler kan føre til hypokaliæmi og melanosis coli samt irreversibel atonisk colon, og langvarig brug af disse midler må fortsat frarådes.

.....

Den hyppigste form for obstipation er funktionel og behandles tilfredsstillende med fiberrig kost, øget væskeindtag, motion og fornuftige defæktionsvaner. Der er sjældent indikation for laksantia.”

Med disse forbehold rekommanderer IRF blandt laksantia det osmotisk virkende stof magnesiumoxid. En række af de øvrige stoffer og former rekommanderes med yderligere forbehold eller i særlige tilfælde.

Lægemedelstyrelsen har med rådgivning fra Medicintilskudsnettet fastsat vejledende kriterier for enkelttilskud til patientens køb af lægemidler mod forstoppelse, jf. nedenfor. De patienter, kriterierne retter sig mod, udgør efter nævnets opfattelse langt hovedparten af de patienter, der bør anvende lægemidlerne med tilskud.

”Enkelttilskud til lægemidler mod forstoppelse vil normalt kunne imødekommes til følgende patientgrupper:

- patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
- svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
- patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
- patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgrib i mave/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.”

Ved behandling af vedvarende obstipation hos børn skal den forventede behandlingsvarighed anføres.

² http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/laksantia_a07.htm

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg.

Tal fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister viser, at omsætningen for salg fra apotek af laksantia i 2008 beløbsmæssigt udgjorde 138,4 mio. kr. 88 % af dette salg er uden receptordination. Salget fordeler sig på under 100.000 ekspeditioner med tilskud og ca. 1,5 mio. ekspeditioner uden tilskud. Salget uden for apotek beløb sig til 3,1 mio. i 2008.

Medicintilskudsnævnets bemærkninger og begrundelser

Medicintilskudsnævnet har baseret sine drøftelser på Lægemiddelstyrelsens vejledning af den 8. juni 2005 om procedure for revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus og Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af den 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Den evidensbaserede viden om laksantia og brugen heraf er yderst sparsom.

Førstevalgsbehandling af forstoppelse er efter nævnets vurdering kostomlægning (fiberrig kost, øget væskeindtag), motion og fornuftige defækationsvaner. Nævnet vurderer, at et generelt tilskud til laksantia eller generelt klausuleret tilskud til de tilfælde, der er omfattet af de vejledende enkelttilskudskriterier vil medføre risiko for, at laksantia anvendes som førstevalg, hvor dette ikke burde være tilfældet. Dette baserer nævnet på sin kliniske erfaring sammenholdt med ovennævnte tal fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, der viser et betydeligt salg uden recept. Nævnet finder, at forbrug af laksantia kan være fornuftigt til fx afhjælpning af akut eller midlertidig forstoppelse, men at dette er et formål, hvortil der ikke med rimelighed kan forventes tilskud fra Regionsrådet. Langt hovedparten af de patienter, hvor der kan forventes tilskud fra Regionsrådet, er efter nævnets opfattelse omfattet af Lægemiddelstyrelsens vejledende enkelttilskudskriterier.

Methylnaltrexon til injektion indtager en særstilling ved at være godkendt til behandling af opioidinduceret obstipation hos patienter med fremskreden sygdom og i palliativ behandling, når respons på behandling med sædvanlige laksantia ikke har været tilstrækkelig.


Medicintilskudsnævnet vurderer, at der kan være risiko for anvendelse uden for den godkendte indikation til patienter med opioidinduceret obstipation, som ikke har fremskreden sygdom og/eller ikke er i palliativ behandling, og til behandling af disse patienter finder nævnet at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi.

Nævnet forventer, at en stor del af forbruget af methylnaltrexon til injektion vil være på sygehusene og finder, at tilskud til de patienter, der behandles i primærsektoren, er egnet til at blive administreret via enkelttilskudsordningen. Nævnet bemærker i den sammenhæng, at en stor del af disse patienter vil være bevilget terminaltilskud, hvorved de får dækket hele udgiften til methylnaltrexon.

Samlet set finder Medicintilskudsnævnet derfor, at alle lægemidler i ATC-gruppe A06 og A02AA04 lægemidler fortsat ikke bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Medicintilskudsnævnets indstilling og tilhørende begrundelser er i vidt omfang baseret på lægemiddelseffer, men det skal understreges, at nævnets vurdering omfatter en stillingtagen til de enkelte lægemidler og deres anvendelse.

På nævnets vegne



Mogens Laue Friis
Formand


Referencer

1. IRF. National rekommandationsliste. Rekommandation og Baggrundsnotater for afføringsmidler (A06) af 09. nov. 2007.
http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/laksantia_a07.htm

Bilag

- A. Grafisk oversigt over ATC-gruppe A06, laksantia og et udsnit af A02, midler mod syrerelaterede forstyrrelser.
- B. Oversigt over lægemiddelstoffer og lægemidler i A06 og A02AA04 med angivelse af den godkendte indikation for det lægemiddel med indhold af det pågældende stof, der har været godkendt længst, lægemiddelnavne, lægemiddelformer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus, priser, forbrug og oplysninger om enkelttilskud.

Bilag A



Lægemidler i ATC-gruppe A06, laksantia, og A02AA, magnesiumforbindelser

Læsevejledning til oversigter nedenfor

Lægemidler: Det eller de lægemidler, med indhold af indholdsstoffet eller indholdsstofferne, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for ATC-gruppe A06 og A02AA. Lægemiddelformen er angivet. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af godkendte lægemidler, der er eller har været markedsført.

Godkendt indikation: Den eller de angivne indikationer for det pågældende lægemiddelstof og eventuelt lægemiddelform, for det lægemiddel, som har været godkendt længst.

Udleveringsgruppe: Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper "A, B etc." fremgår af § 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 155 af den 20. februar 2007.

Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

Behandlingspris: Priser for de lægemidler, for hvilke, der er anmeldt en pris til Lægemiddelstyrelsen og oplysninger om enkelttilskud. Langt hovedparten af lægemidlerne i gruppen har udleveringsstatus HF og er derfor ikke begrænset til salg fra apotek. Virksomhederne har derfor ikke pligt til at indberette en pris for disse lægemidler til Lægemiddelstyrelsen - priserne fastsættes lokalt af distributøren.

Forbrug: Antallet af personer i behandling er taget fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk.

Enkelttilskud: Oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud og bevillingsprocent. Lægemiddelstyrelsens offentliggjorte vejledende kriterier for enkelttilskud er anført til sidst.

A06AB – Kontaktlaksantia

A06AB02	Bisacodyl
Lægemidler	Dulcolax enterotabletter Dulcolax suppositorier Perilax enterotabletter Perilax suppositorier Toilax enterotabletter
Godkendt indikation	"Tarmtømning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse. Korttidsanvendelse ved obstipation."
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 20.105 2007: 20.701 2008: 21.493
Enkelttilskud	2006: 129 ansøgninger, 124 bevilget (96 %) 2007: 150 ansøgninger, 148 bevilget (99 %) 2008: 130 ansøgninger, 126 bevilget (97 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AB08	Natriumpicosulfat
Lægemidler	Actilax orale dråber, opløsning Laxoberal orale dråber, opløsning Laxoberal kapsler, bløde Picolon orale dråber, opløsning
Godkendt indikation	”Obstipation.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 28.315 2007: 26.413 2008: 24.080
Enkeltilskud	2006: 321 ansøgninger, 299 bevilget (93 %) 2007: 319 ansøgninger, 303 bevilget (95 %) 2008: 266 ansøgninger, 247 bevilget (93 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AC – Volumenforøgende midler

A06AC01	Ispaghula (loppefrø)
Lægemidler	Vi-siblin granulat
Godkendt indikation	”Obstipation.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 295 2007: 245 2008: 222
Enkeltilskud	2006: 1 ansøgning, 0 bevilget (0 %) 2007: 2 ansøgninger, 0 bevilget (0 %) 2008: 2 ansøgninger, 2 bevilget (100 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AD – Osmotisk virkende laksantia

A06AD	Osmotisk virkende laksantia, ufuldstændig ATC-kode
Lægemidler	Moviprep pulver til oral opløsning Phosphoral oral opløsning
Godkendt indikation	Moviprep pulver til oral opløsning ”Til rensning af tarmen før alle kliniske undersøgelser som kræver en ren tarm f. eks. endoskopier eller røntgenundersøgelser.”

	Phosphoral oral opløsning: ”Tarmtømmning før kolonoperation, røntgenundersøgelse af kolon eller en doskopisk undersøgelse.”
Udleveringsgruppe	HA/HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Moviprep: 50,24 kr. per pulver Phosphoral: Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 1.678 2007: 1.650 2008: 2.045
Enkelttilskud	2006: 0 ansøgninger 2007: 0 ansøgninger 2008: 4 ansøgninger, 3 bevilget (75 %)

*Gælder både for Moviprep og Phosphoral. ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AD02	Magnesiumoxid
Lægemidler	Salilax granulat til oral opløsning
Godkendt indikation	”Tarmtømmning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse. Anvendes i kombination med bisacodyl.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 126 2007: 91 2008: 72
Enkelttilskud	2006: 1 ansøgning, 1 bevilget (100 %) 2007: 0 ansøgninger 2008: 0 ansøgninger

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AD11	Lactulose
Lægemidler	Lactulose “Copyfarm” oral opløsning Laktulose “Danipharm” oral opløsning Laktulose “PS” oral opløsning Laktulose “medic” oral opløsning Medilax oral opløsning Medilax Chokomint oral opløsning Medilax Frugt oral opløsning
Godkendt indikation	”Tarmregulerende ved kronisk obstipation. Forebyggelse og behandling af hepatisk og portosystemisk encefalopati.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i	2006: 39.002

behandling	2007: 36.157 2008: 33.991
Enkelttilskud	2006: 319 ansøgninger, 282 bevilget (88 %) 2007: 241 ansøgninger, 215 bevilget (89 %) 2008: 202 ansøgninger, 186 bevilget (92 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AD12	Lactitol
Lægemidler	Importal oralt pulver
Godkendt indikation	"Symptomatisk behandling af obstipation. Forebyggelse og behandling ved hepatisk og portosystemisk encefalopati."
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 104 2007: 29 (Markedsført frem til 26. februar 2007)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AD65	Macrogol, kombinationer
Lægemidler	Klean-prep pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Movicol pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Moxalone pulver til oral opløsning
Godkendt indikation	<i>Movicol</i> : "Behandling af kronisk obstipation. Refraktær obstipation: opløsning af retineret fæces i colon og/eller rectum verificeret ved lægeundersøgelse af abdomen og rectum." <i>Klean-prep</i> : "Tarmtømning før endoskopisk undersøgelse eller operation."
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 20.219 2007: 27.683 2008: 35.252
Enkelttilskud	2006: 751 ansøgninger, 676 bevilget (90 %) 2007: 1088 ansøgninger, 935 bevilget (86 %) 2008: 1509 ansøgninger, 1335 bevilget (88,5 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AG – Klystermidler

A06AG01	Natriumphosphat
Lægemidler	Fleet Klar-til-brug rektalvæske opløsning
Godkendt indikation	"Obstipation. Tarmtømning før operation, proktoskopi, sigmoidoskopi eller

	røntgenundersøgelse.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 1.264 2007: 1.079 2008: 1.006
Enkelttilskud	2006: 23 ansøgninger, 21 bevilget (91 %) 2007: 26 ansøgninger, 25 bevilget (96 %) 2008: 12 ansøgninger, 12 bevilget (100 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AG02	Bisacodyl
Lægemidler	Toilax rektalvæske, suspension, enkeltdosisbeholder
Godkendt indikation	”Tarmtømning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse. Korttidsanvendelse ved obstipation.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 984 2007: 866 2008: 867
Enkelttilskud	2006: 10 ansøgninger, 10 bevilget (100 %) 2007: 17 ansøgninger, 17 bevilget (100 %) 2008: 25 ansøgninger, 25 bevilget (100 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AG10	Natriumdocusat inkl. kombinationspræparater
Lægemidler	Glyoktyl klyksma Klyx rektalvæske, opløsning
Godkendt indikation	”Obstipation. Tarmtømning hvor dette er indiceret, prokto- og sigmoidoskopi eller røntgenundersøgelse.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 8.554 2007: 8.258 2008: 8.202
Enkelttilskud	2006: 218 ansøgninger, 209 bevilget (96 %) 2007: 282 ansøgninger, 272 bevilget (96 %) 2008: 259 ansøgninger, 251 bevilget (97 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

--	--

A06AG11	Laurilsulfat inkl. kombinationspræparater
Lægemidler	Microlax rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
Godkendt indikation	”Obstipation. Tarmtømning før operation, proktoskopi eller røntgenundersøgelse.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 10.778 2007: 10.192 2008: 9.708
Enkeltilskud	2006: 107 ansøgninger, 101 bevilget (94 %) 2007: 99 ansøgninger, 96 bevilget (97 %) 2008: 112 ansøgninger, 108 bevilget (96 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06AX – Andre laksantia

A06AX01	Glycerol
Lægemidler	Glycerol ”OBA” suppositorier
Godkendt indikation	”Obstipation.”
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 353 2007: 335 2008: 346
Enkeltilskud	2006: 42 ansøgninger, 41 bevilget (98 %) 2007: 33 ansøgninger, 31 bevilget (94 %) 2008: 29 ansøgninger, 25 bevilget (86 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

A06	Laksantia, ufuldstændig ATC-kode (indholdsstof: Methylnaltrexonbromid)
Lægemidler	Relistor injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Behandling af opioidinduceret obstipation hos patienter med fremskreden sygdom og i palliativ behandling, når respons på behandling med sædvanlige laksantia ikke har været tilstrækkelig.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	320,98 kr. per injektion
Forbrug	Markedsført 11. august 2008

A02AA – Magnesiumforbindelser

A02AA04	Magnesiumhydroxid
Lægemidler	Magnesia "DAK" filmovertrukne tabletter Magnesia "medic" filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Gastritis acida. Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Esophagitis. Obstipation.
Udleveringsgruppe	HF
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Behandlingspris	Uden fast pris
Forbrug* - antal personer i behandling	2006: 32.786 2007: 32.694 2008: 32.277
Enkelttilskud	2006: 107 ansøgninger, 97 bevilget (91 %) 2007: 123 ansøgninger, 117 bevilget (95 %) 2008: 112 ansøgninger, 106 bevilget (95 %)

*ATC-gruppen indeholder håndkøbslægemidler. Antal personer er kun talt op for receptsalget.

Lægemiddelstyrelsens vejledende kriterier for enkelttilskud til laksantia:

"Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, når der er tale om:

- patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
- svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
- patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
- patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling."