

Patientinformationsark for cannabismellemprodukt

Bedrobinol "CannGros"

Urtete/inhalationsdamp, droge

1 gram droge indeholder: 135 mg dronabinol (THC) og maksimalt 10 mg cannabidiol (CBD)

Dette produktinformationsark er udarbejdet af mellemproduktfremstilleren af det omhandlende cannabismellemprodukt. Det er vedlagt i pakningen og publiceret sammen med produktarket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så læger, apoteker, borgere mfl. derved kan orientere sig i disse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Oversigt

1. Indhold
2. Beskrivelse af anvendelse/tilberedningsmåde
3. Opbevaring og holdbarhed
4. Yderligere oplysninger

1. Indhold

1 g indeholder:

1 g *Cannabis sativa* L., flos (cannabisblomst), svarende til 135 mg dronabinol (THC) og maksimalt 10 mg cannabidiol (CBD)

Urtete/inhalationsdamp, droge.

1 ml findelt produkt svarer til ca. 0,1 g findelt produkt.

Dobbelt måleske på 2 ml samt 10 ml, og med en graduering på henholdsvis 0,5 ml – 1 ml – 2 ml samt 3 ml – 5 ml – 7 ml – 10 ml er vedlagt i pakningen.

2. Beskrivelse af anvendelse/tilberedningsmåde

Brug altid produktet efter lægens anvisning, ved tvivl kontaktes lægen.
Rygning af cannabisproduktet frarådes.

Beskrivelse af anvendelse/tilberedningsmåde

Du kan tage Bedrobinol "CannGros" på forskellige måder. For eksempel tilberedt som te eller inhaleret ved hjælp af en fordamper. Det er vigtigt for effekten at opvarme cannabis før man bruger det.

Ved inhalation absorberes de aktive komponenter af cannabis hurtigt i kroppen. Den maksimale effekt opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over tre til fire timer. Det er nemt at justere dosis ved inhalation. Hvis effekten er utilstrækkelig, kan du inhalere mere. Du kan også stoppe, når du opnår ønsket effekt, eller når du begynder at mærke bivirkninger.

Når Bedrobinol "CannGros" drikkes som te, tager det mindst 30 til 90 minutter før eventuelle virkninger opnås. Den maksimale effekt opnås normalt efter to til tre timer, og virkningen aftager efter fire til otte timer. Indtag af fedtholdig mad med teen, kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.

Tilberedning af urtete

Findeling af blomst skal foretages ved hjælp af urtekværn inden afmåling med måleske. Det anbefales at benytte en urtekværn vedlagt medicinsk certificeret udstyr som f.eks. MIGHTY MEDIC eller MIGHTY+ MEDIC. Urtekværnen fås også uden fordamper. Tag eventuelt kontakt til Stenocare A/S for oplysninger og information herom.

- Kog 500 ml vand i en gryde med låg på.
- Tilsæt Bedrobinol "CannGros" afmålt med medfølgende måleske. Dosis afmåles efter lægens anvisning.
- Sænk varmen og lad teen koge forsigtigt i 15 minutter med låget på.
- Tag teen af kogepladen og hæld den gennem en sigte.
- Hæld teen i en termoflaske eller tekande, hvis du planlægger at drikke den samme dag.

Hvis du ønsker at lave te til flere dage, skal du efter tilberedning af te som beskrevet ovenfor, tilsætte en teskefuld kaffeflødepulver til den varme te. Det vil holde de aktive stoffer i teen fra at sætte sig på indersiden af tekanden eller koppen, hvilket reducerer effekten. Lad teen køle af og opbevar den i køleskabet.

Du kan opvarme den afkølede te og tilføje sukker, sirup eller honning for at forbedre smagen.

Dosering

Følg altid lægens anvisninger til dosering.

Spørg din læge om inhalation af Bedrobinol "CannGros" ved anvendelse af en fordamper, hvis teen ikke giver tilstrækkelig lindring. Inhalation virker hurtigere, og effekten er stærkere end cannabis te. Desuden er dosis lettere at justere.

Tilberedning ved hjælp af fordamper og inhalation

For inhalation af Bedrobinol "CannGros" bør du anvende en pålidelig fordamper så som f.eks. MIGHTY MEDIC eller MIGHTY+ MEDIC, der begge er certificeret medicinsk udstyr. Tag eventuelt kontakt til Stenocare A/S for oplysninger og information herom.

Findeling af blomst skal foretages ved hjælp af urtekværn inden dosering (urtekværn og instruktion for brug af denne er vedlagt de anbefalede fordampere).

Dosering

Følg altid lægens anvisninger til dosering. Dosis afmåles efter lægens anvisning. Findeling af blomst skal foretages ved hjælp af urtekværn inden afmåling. Findel blomsten i urtekværnen med 5 drej på kværnen. Placer produktet i fordamperen, opvarm Bedrobinol "CannGros" og inhalér derefter.

Det anbefales at vente 5 til 15 minutter mellem inhalationer. Gentag efter lægens anvisninger – indtil den ønskede effekt opnås, eller indtil der opleves uønskede bivirkninger (fysiske eller mentale).

Det anbefales at doseringen gradvist opbygges. Rådfør dig altid med din læge, da dosering kan variere meget fra patient til patient.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bedrobinol "CannGros" end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

3. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastdåse, tæt lukket, for at beskytte mod lys og fugt.

4. Yderligere oplysninger

Pakningsstørrelse

5 gram

Navn og adresse på fremstilleren af cannabismelleproduktet

Stenocare A/S
Lejrvej 9
3500 Værløse

Dette patientinformationsark blev senest ændret

30.01.2026

Du kan finde yderligere oplysninger om dette produkt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>.