



## Patientens data

Efternavn

fornavn

Telefon

## Kontakt i akutte tilfælde

Efternavn

fornavn

Telefon

## Lægens kontaktoplysninger

Lægens efternavn

Telefon

Adresse

Patientkort til

**BCG-medac**

(BCG - Bacillus Calmette-Guérin)

: medac

**VIGTIG INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALE**

Denne patient er/har været i behandling med BCG-medac på grund af blærekræft. BCG-medac kan forårsage systemiske infektioner, som kan være fatale, hvis de ikke behandles korrekt.

BCG indeholder en lyofiliseret suspension af levende Bacillus Calmette-Guérin-bakterier, udledt af *Mycobacterium bovis*, med lavt smittepotentiale. Denne stamme er ikke virulent. Patienten behøver derfor ikke blive isoleret.

Systemiske BCG-infektioner kan opstå selv flere år efter, at den sidste dosis er administreret som en intravesikal instillation. Disse infektioner kan vise sig som feber, svedeture om natten, væggtab, lunge- eller levergranulom, konjunktivitis eller Reiters syndrom, abscesser, inficerede aneurismer eller infektion i et implantat eller graft, også i det omgivende væv. Tidlig diagnosticering og relevant behandling er afgørende for at minimere eventuelle konsekvenser af infektionen.

Bemærk, at en negativ mykobakterietest ikke udelukker en systemisk BCG-infektion, uanset det anvendte prøvemateriale (blod, urin, serum). Der er rapporteret om flere tilfælde af negative blod-/urindyrkninger, selvom patienten havde en systemisk BCG-infektion.

Behandlingen af en mistænkt BCG-infektion afhænger af de kliniske symptomers beskaffenhed og sværhedsgrad.

Du bedes indberette formodede bivirkninger. Se kontaktoplysningerne på kortets bagside.

Se venligst det gældende produktresumé for yderligere information.

Det anbefales at konsultere en speciallæge i infektionssygdomme.

## VIGTIGT

Dette kort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, du skal være opmærksom på under og efter behandling med BCG-medac. Opbevar kortet i din pung, og vis det til de læger og sundhedsmedarbejdere, der behandler dig, og ikke kun din ordinerende urolog. Opbevar også kortet i nærheden, efter at behandlingen med BCG-medac er afsluttet!

Der kan opstå bivirkninger af BCG-medac når som helst under behandlingen og endda flere år efter behandlingens afslutning. De kan behandles, hvis de diagnosticeres.

Fortæl det også til din læge, hvis du får andre mistænkelige symptomer, der ikke er anført på dette kort, og som bekymrer dig.

Forsøg ikke selv at behandle dine symptomer med anden medicin.

Behandling med BCG-medac kan medføre en bivirkning i form af en systemisk infektion. En sådan infektion kan udvikle sig når som helst, selv flere år efter den sidste inddrypning. Den kan dog behandles, hvis den diagnosticeres.

Tegnene og symptomerne på en såkaldt „forsinket BCG-infektion“ er sommetider svære at genkende, fordi de kan ligne symptomerne på andre sygdomme.

Disse tegn og symptomer på en BCG-infektion uden for blæren kan være

- Feber over 39,5 °C i mindst 12 timer eller feber over 38 °C, der har varet flere uger; svedeture om natten
- Vægttab af ukendt årsag
- En tiltagende følelse af utilpashed
- Symptomer på en betændelse kan variere og vise sig som
  - vejtrækningsbesvær eller hoste, der ikke føles som en normal forkølelse,

- leverproblemer: en følelse af trykken øverst til højre på maven eller uregelmæssigheder i leverfunktionstest (især et enzym, der hedder alkalisk fosfatase) eller
- smerter og rødme i øjnene, synsproblemer eller sløret syn; bindehindekatar
- En såkaldt granulomatøs betændelse, der er påvist i en biopsi.

**Du skal tage på hospitalet, opsøge din egen læge eller din urolog, hvis du får to eller flere af ovenstående symptomer, også selvom det er lang tid siden, du er blevet behandlet for blærekræft.**

- Medbring dette kort og en komplet liste over den medicin, du tager. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, vitaminer og naturmedicin.
- Fortæl lægerne og/eller sygeplejerskerne, at du er/har været i behandling med BCG, og vis dem dette kort, så de ved, hvordan de skal behandle dig.

Læs indlægssedlen, hvis du har brug for mere information.

### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, er det vigtigt, at du taler med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemedelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.