

EPIPEN®

EPIPEN® Jr

(Adrenaline) Auto-Injectors 0.3/0.15mg



**FAKTA  
OM  
ANAFYLAKSI**

**MEDA**

# 1

## HVAD ER ANAFYLAKSI?

Anafylaksi er en alvorlig og potentielt livstruende allergisk reaktion. Symptomerne kan vise sig inden for få sekunder eller minutter, efter du har været i kontakt med det, du er allergisk overfor – en såkaldt allergisk trigger eller et allergen.

En anafylaktisk reaktion opstår, når din krops immunsystem overreagerer på et ellers uskadeligt stof, f.eks. visse typer af fødevarer. Din krop reagerer ved at frigive kemikalier, som skal beskytte den. Og det er denne reaktion, der kan fremkalde livstruende symptomer.

### a) Ting, der typisk udløser en anafylaktisk reaktion



#### Mad

F.eks. jordnødder, hasselnødder, pekannødder, æg, soja, fisk, skaldyr, hvede eller mælk. Mere end 30 % af alle alvorlige allergiske reaktioner er udløst af fødevareallergener



#### Insektgift

F.eks. fra bier, hvepse, gedehamse eller humlebier. Mere end 3 % voksne og 1 % børn oplever allergiske reaktioner ved insektgift.



#### Medicin

F.eks. antibiotika, narkosemidler eller smertestillende medicin.



#### Latex

F.eks. handsker, plastre eller kondomer.



#### Fysisk stress (f.eks. træning)

Forekommer yderst sjældent, potentielt i kombination med andre faktorer



#### Andre årsager

Ikke-kendte allergener

## b) Genkend symptomerne

En anafylaktisk reaktion viser sig ofte ved, at du får det fysisk dårligt. Symptomerne viser sig inden for få minutter, og det er derfor vigtigt, at du bliver behandlet med det samme. Har du fået en alvorlig allergisk reaktion, kommer det til udtryk ved følgende symptomer:

- Besværet/højlydt vejrtrækning
- Hævet tunge
- Hævelse/tæthed i halsen
- Hævet ansigt/læbe/øjenlåg
- Svært ved at tale og/eller hæs stemme
- Hvæsende eller vedvarende hoste
- Bevidstløshed eller ildebefindende
- Eller når små børn bliver blege eller slappe

Dette er ikke en komplet liste over symptomer. Tal altid med din læge om, hvad du skal være opmærksom på.

## c) Hvordan behandler du anafylaksi?

Du bør først og fremmest finde ud af, hvad der udløser din allergi og undgå disse ting. Det er meget vigtigt, at du kan genkende tegn og symptomer på anafylaksi. Man anbefaler en adrenalinindsprøjtning i muskelen til behandling af en anafylaktisk reaktion for at undgå, at symptomerne udvikler sig – efter indsprøjtningen skal du ringe til en læge. Du skal have adrenalin, så snart du oplever symptomer, så de ikke udvikler sig til anafylaksi (se afsnit 1b). Adrenalinindsprøjtningen bevarer blodgennemstrømningen og reducerer hævelsen, fordi den skaber en blodkarforsnævring, som øger blodtrykket. Derudover giver adrenalin en afspænding i bronkierne, som gør det lettere at trække vejret.

# 2

## HVAD ER EIPEN®/ EIPEN® JR ADRENALIN AUTOINJEKTOR?

EpiPen®/EpiPen® Jr er en automatisk indsprøjtningssenhed til engangsbrug, som er forhånds-doseret til at administrere adrenalin i tilfælde af en alvorlig allergisk reaktion. EpiPen®/EpiPen® Jr autoinjektor er designet til at blive brugt af patienter til indsprøjtning af en standardiseret adrenalindosis i låret i tilfælde af en livstruende anafylaktisk reaktion. En EpiPen®/EpiPen® Jr kan kun bruges én gang.

### a) Kendetegn ved EpiPen®

#### Blå beskyttelseshætte

Forhindrer uhensigtsmæssig aktivering af EpiPen®.

#### Instruktioner


Udførlig trin-for-trin vejledning, som vejleder om brug i en nødsituation.

#### Gennemsynsvindue

Tjek regelmæssigt for at sikre, at opløsningen er klar og farveløs. Bliver opløsningen mørk eller uklarer, skal du kontakte din læge og udskifte din EpiPen®.

#### Orange spids, som beskytter nålen

Holder nålen tildækket både før og efter brug.





### Hårdt plasticrør med låg

Beskytter og sikrer hurtig adgang til din EpiPen®.

### Orange spids

Før brug



Efter brug



### Gennemsynsvindue

Før brug



Efter brug



## b) Hvordan bruger du EpiPen®/EpiPen® Jr?

Tag EpiPen®/EpiPen® Jr ud af plasticrøret. Læg dig ned med benene bøjede for at lette blodgennemstrømningen, eller sæt dig op, hvis du har svært ved at trække vejret.

1



Tag EpiPen®/EpiPen® Jr i den hånd, du normalt skriver med, og hold tommelfingeren nærmest den blå beskyttelseshætte. Knyt hånden omkring EpiPen®/EpiPen® Jr, og træk den blå beskyttelseshætte af med modsatte hånd. Husk: Blå mod himmel, orange mod lår.

2




Hold EpiPen®/EpiPen® Jr i en afstand af ca. 10 cm fra låret. Den orange spids skal pege mod ydersiden af låret.

3



Stød EpiPen®/EpiPen® Jr med et fast greb mod ydersiden af låret i en ret vinkel (90 grader). Hold spidsen mod låret i 10 sekunder.

4



Efter brug trækker den orange spids sig automatisk ud over nålen. EpiPen®/EpiPen® Jr fjernes og bortskaffes på forsvarlig vis.

5



Massér injektionsstedet i 10 sekunder. Ring 1-1-2, bed om en ambulance og sig "anafylaksi".

Bliv liggende/siddende, og få nogen til at blive hos dig, til en læge har set på dig.

Bevidstløse patienter skal placeres i aflåst sideleje.

1



2



3



4



Se mere på [www.epipen.eu](http://www.epipen.eu) (du logger ind med koden: epipen1205), hvor du også kan se videoen "Sådan bruger du din EpiPen®/EpiPen® Jr".

Hav altid 2 EpiPen®/EpiPen® Jr på dig – hvis dine symptomer ikke aftager efter 5-15 minutter, kan det være nødvendigt med endnu en dosis. Din EpiPen®/EpiPen® Jr kan kun bruges én gang.

Fortæl folk i din omgangskreds, at du er i risiko for en anafylaktisk reaktion, og forklar, hvad der kan udløse den. Sørg for, at familie, venner, lærere og kollegaer kan genkende dine anafylaktiske symptomer, og fortæl dem, hvad de skal gøre, hvis du får en anafylaktisk reaktion. Husk at oplyse dem om, hvor du opbevarer din EpiPen®/EpiPen® Jr, og hvordan de bruger den.

Hvis du har en EpiPen® træningspen, skal du sørge for at opbevare den originale EpiPen®/EpiPen® Jr og træningspennen hver for sig, så de ikke forveksles i en nødsituation.

# 3

## EPIPEN®/EPIPEN® JR SPØRGSMÅL OG SVAR

### **SP: Hvad er forskellen på EpiPen® og EpiPen® Jr?**

**SV:** Begge indeholder adrenalin, men i forskellige mængder. Vejer du mere end 30 kg, skal du bruge EpiPen®. Vejer du mellem 15 og 30 kg, skal du bruge EpiPen® Jr. Din praktiserende læge fortæller dig, hvilken en du skal have.

### **SP: Hvordan ved jeg, om min EpiPen®/EpiPen® Jr fungerer, og om jeg har fået den dosis adrenalin, jeg har brug for?**

**SV:** Når du støder din EpiPen®/EpiPen® Jr ind i låret, bliver nålen og adrenalindosen udløst. Når du fjerner EpiPen®/EpiPen® Jr, trækker den orange spids sig ud over nålen, og gennemsynsvinduet bliver mørkt. Der vil være lidt adrenalin tilbage i pennen, men det er helt normalt. Du vil hurtigt opleve, at adrenalinen virker. Husk, at en EpiPen®/EpiPen® Jr kun kan bruges én gang.



EpiPen® Jr - til dem, der vejer mellem 15 og 30 kg.





Hvis væsken i dit gennemsynsvindue er mørk eller farvet, bør du anskaffe dig en ny autoinjektor.

**SP: Der er en luftboble i min EpiPen®/EpiPen® Jr – kan jeg stadig bruge den?**

**SV:** Boblen kommer af en gas kaldet nitrogen, og det er ikke unormalt at finde sådan en boble i en EpiPen®/EpiPen® Jr. Du kan derfor trygt bruge din pen – boblen har ingen indflydelse på virkningen.

**SP: Hvor skal jeg opbevare min EpiPen®/EpiPen® Jr?**

**SV:** Adrenalin er følsomt over for lys, så opbevar din autoinjektor i den ydre karton/den originale indpakning. Den skal opbevares ved maks. 25 grader og må ikke lægges i køleskabet eller fryseren, ligesom den heller ikke må udsættes for ekstrem varme. Hvis din EpiPen®/EpiPen® Jr bliver udsat for lys eller luft, bliver adrenalin hurtig forringet, og opløsningen bliver lyserød eller brun. Sørg for jævnligt at tjekke gennemsynsvinduet på din EpiPen®/EpiPen® Jr – opløsningen skal være klar og farveløs. Du skal udskifte din autoinjektor, når udløbsdatoen er nået, eller hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder bundfald.

**SP: Hvordan skiller jeg mig af med min ubrugte EpiPen®/EpiPen® Jr, når udløbsdatoen er nået?**

**SV:** Kontakt din læge eller dit apotek – her kan du få hjælp.

**SP: Hvad gør jeg, hvis min EpiPen®/EpiPen® Jr er forældet?**

**SV:** Kontakt din læge eller dit lokale apotek hurtigst muligt, så du kan få en ny pen. Indstil evt. en alarm på din mobiltelefon, så du bliver opmærksom på, når din pen er ved at udløbe.



Hvis du har problemer med din EpiPen®/EpiPen® Jr, bør du kontakte din læge eller dit lokale apotek, som kan rådgive dig.



EpiPen®/EpiPen® Jr med på rejsen.

**SP:** Er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på, når jeg skal have EpiPen®/EpiPen® Jr med på rejsen?

**SV:** Du skal være sikker på at have nok penne med, da det i nogle lande kan være svært at få fat på en EpiPen®/EpiPen® Jr. Derudover kræver nogle flyselskaber en lægeerklæring. Kontakt dit flyselskab for yderligere information.


# 4

## YDERLIGERE INFO OM EPIPEN®/EPIPEN® JR

Du kan træne i brugen af din EpiPen®/EpiPen® Jr ved at scanne QR-koden herunder eller gå ind på [epipen.eu](http://epipen.eu) (du logger ind med koden: `epipen1205`)



EpiPen® instruktionsvideo



Meda AS  
(A Mylan Company)  
Solvang 8  
3450 Allerød

[www.epipen.eu](http://www.epipen.eu)



# EpiPen®/EpiPen Jr® TJEKLISTE

Navn/Fornavn

Fødselsdato

Dato

1

Har du diagnosticeret din patient som værende i risiko for – eller har patienten allerede haft en – anafylaktisk reaktion?

JA

2

Er patienten bekendt med, hvornår man skal anvende adrenalin?

JA, patienten anvender allerede EpiPen®/EpiPen Jr®

▶ Gå til **TRIN 3**

JA, men patienten anvender ikke EpiPen®/EpiPen Jr®

▶ Gå til **TRIN 2**

NEJ

▶ Gå til **TRIN 1**

**TRIN 1:** Har du informeret patienten om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af kontakt med et allergen, og hvornår man skal anvende adrenalin?

JA

▶ Gå til **TRIN 2**

**TRIN 2:** Har du introduceret EpiPen®/EpiPen® Jr for patienten og vist, hvordan den fungerer ved hjælp af EpiPen®/EpiPen® Jr træningspennen samt vist videoen "Sådan bruger du EpiPen®"? (Se bagsiden for yderligere information)

JA

▶ Gå til **TRIN 3**

**TRIN 3:** Har du fået patienten til at vise dig at han/hun kan anvende EpiPen®/EpiPen® Jr ved hjælp af træningspennen?

JA

3

Har du anbefalet patienten at øve sig jævnligt i hvordan man bruger EpiPen®/EpiPen® Jr, samt at instruere sin nærmeste omgangskreds i dette?

JA

4

Har du anbefalet patienten altid at have 2 EpiPen®/EpiPen® Jr på sig i tilfælde af, at symptomerne ikke aftager og endnu en dosis er nødvendig?

JA

5

Har du anbefalet patienten at sætte en alarm, som påminder om, at udløbsdatoen for EpiPen®/EpiPen® Jr er nået, så patienten kan skaffe en ny EpiPen®/EpiPen® Jr i tide?

JA



## Sådan BRUGER du EpiPen®/EpiPen Jr®

Tag EpiPen®/EpiPen Jr® ud af plasticrøret. Lig ned med dine ben en smule hævet for at lette blodgennemstrømningen – eller sid op, hvis du har svært ved at trække vejret.

- 

1 Tag fat om **EpiPen®/EpiPen® Jr** med den hånd, du normalt skriver med og hold tommelfingeren nærmest den blå hætte. Knyt hånden om **EpiPen®/EpiPen® Jr**, og træk den blå beskytteshætte af.  
**Husk: Blå mod himlen, orange mod låret.**
- 

2 Hold **EpiPen®/EpiPen® Jr** i en afstand af ca. 10 cm fra låret. Den orange spids skal pege mod låret.
- 

3 Stød **EpiPen®/EpiPen® Jr** med et fast greb mod ydersiden af låret i en ret vinkel (90 grader). Hold den fast mod låret i 10 sekunder.
- 

4 **EpiPen®/EpiPen® Jr** fjernes og bortskaffes efterfølgende på forsvarlig vis. Den orange spids trækker sig automatisk ud over nålen.
- 

5 Massér injektionsstedet i 10 sekunder. Ring 1-1-2, bed om en ambulance og sig 'anafylaksi'.

En EpiPen®/EpiPen® Jr kan kun bruges én gang. Hvis symptomerne ikke aftager, kan du anvende endnu en EpiPen®/EpiPen® Jr efter 5-15 minutter.

## Hvor skal jeg OPBEVARE min EpiPen®/EpiPen Jr®

- Din **EpiPen®/EpiPen Jr®** må ikke opbevares ved mere end 25 grader og må ikke lægges i køleskabet eller fryseren.
- Behold plasticrøret med **EpiPen®/EpiPen Jr®** i den ydre karton/den originale indpakning, hvor den er beskyttet mod lys. Hvis adrenalin bliver udsat for lys eller luft, bliver dets effekt forringet, og opløsningen i **EpiPen®/EpiPen Jr®** bliver lyserød eller brun.
- Sørg for jævnlige tjekke gennemsynsvinduet på din **EpiPen®/EpiPen Jr®** – opløsningen skal være klar og farveløs.
- Udskift din **EpiPen®/EpiPen Jr®**, når udløbsdatoen er nået, eller hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder bundfald.



# ESSENTRA

## PACKAGING

Design Ref: LB058904  
 Customer Ref: 34421B  
 Customer Name: European Packaging Centre  
 Version No: 1.0  
 Artwork Created: 14.14.14  
 Designer: Wilf

Label Size: 109x85mm  
 Gap: 3.9mm  
 Cutter: CT4526L02\EFMAG.02599  
 Material: Ritrama Gloss White PP AP901 WG62  
 Adhesive: Permanent  
 Barcode: n/a  
 Supplied Barcodes Below 80% Magnification May Not Read/Scan

- |  |                 |                          |          |
|--|-----------------|--------------------------|----------|
|  | 1 Pantone 1505c |                          | 6 Cutter |
|  | 2 Pantone 290c  | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 3 Cool Grey4c   | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 4 Process Blue  | <input type="checkbox"/> |          |
|  | 5 Black         | <input type="checkbox"/> |          |



Core Dia: 76x6mm  
 Max Reel Dia: 280mm  
 Qty Per Reel: 1000  
 Sequential No: No

- Approved, Proceed To Production  
 Amend & Re-Proof

\*Signed: Date:  
 Signed: Date:  
 Signed: Date:

\*Print Name: Job Title:

Company:

Please Ensure That You Check This Proof Carefully. It Is Important That You Check Size, Text, Barcodes & Pantone References As Your Label Will Be Produced According To Approval

**GODKENDT**

Af maiken wendell kl. 10:10 , 20-10-2014

**EPIPEN® TRAINER**  
AUTOINJEKTOR TIL TRÆNINGSBRUG

**INDEHOLDER HVERKEN MEDICIN ELLER NÅL**

**1** Træk den blå beskyttelses-hætte af.

**2** Stød beslutsomt den orange spids direkte ind mod ydersiden af låret, indtil et klik høres. Hold den fast i låret i 10 sekunder.

**3** Den orange spids vil udvides efter brug. Se anden side for nulstilling.

**EPIPEN® TRAINER**  
AUTOINJEKTOR TIL TRÆNINGSBRUG

Se anden side for instruktion

**a** Fjern den blå beskyttelses-hætte umiddelbart før aktiveringen.

**b** Hold i et fast greb. HOLD IKKE tommelfingeren hen over den orange spids. Aktiver den ved at støde beslutsomt den orange spids direkte ind mod ydersiden af låret. Du vil høre en kliklyd, når du har aktiveret den. Hold den fast i låret i 10 sekunder.

**NULSTILLING**

**1** Sæt den blå beskyttelses-hætte tilbage.

**2** Placér den orange spids på en hård overflade. Klem siderne på spidsen og tryk ned.

EpiPen® er et registreret varemærke tilhørende M/Man 550K2065303-02 34421B

Meda AS - Solvang 8 - DK-3450 Allerød

LOT:

DIRECTION THROUGH PRESS

# Video

## Introduktion

Hej, og velkommen til denne træningsvideo om EpiPen adrenalin auto-injektor. Her vil vi gennemgå EpiPens vigtigste funktioner, så du bliver klædt på til, hvordan du anvender EpiPen, og hvordan du øver dig med din EpiPen træningspen.

Det er en god idé at se videoen ofte, fx hver anden måned – og vise den til dine venner, din familie og din lærer, så du og din omgangskreds bliver helt fortrolig med, hvordan din EpiPen fungerer. Du kan øve dig med din træningspen, mens du ser denne video – så ved du, hvordan EpiPen fungerer, hvis der skulle opstå en nødsituation.

Dette her er EpiPen autoinjektor. Den fås i to udgaver: En til personer, der vejer mere end 30 kg – den har en gul etiket. Og en til personer, der vejer mellem 15 og 30 kg – den har en grøn etiket og kaldes EpiPen Junior. Begge penne fungerer på samme måde.

Sørg for altid at have din EpiPen med dig, lige meget hvor du er. Af hensyn til dit helbred, bør du altid have 2 EpiPenne i nærheden.

## Egenskaber

Hvad du skal være opmærksom på med din EpiPen? Alle EpiPenne har tydelige farvekoder.

Som du kan se, har den en **blå sikkerhedslås** og en **orange spids, som beskytter nålen**. På den måde kan du hurtigt finde den rigtige ende i en nødsituation. En let huskeregel er, fjern den blå sikkerhedslås, sæt den orange spids mod låret.

Nålen er placeret inden i den orange spids. Når du har udløst din EpiPen, trækker spidsen sig automatisk ud over nålen igen, så du ser aldrig nålen. Den orange spids sikrer også, at du ikke kommer til at stikke dig ved et uheld.

I gennemsynsvinduet kan du se, om opløsningen er klar og farveløs. Det er vigtigt, at du tjekker opløsningens udseende regelmæssigt, da du skal udskifte din EpiPen, så snart at opløsningen bliver mørk eller uklar. Via gennemsynsvinduet kan du også se, om du har brugt din EpiPen korrekt. Når dosen af adrenalin er sprøjtet ind, bliver vinduet mørkere. Som du kan se, er der tydelig forskel på vinduets udseende før og efter injektionen.

Instruktionerne på din EpiPen er nemme at læse og tydeligt illustreret. Dette giver dig – eller dem, du er sammen med – en hurtig instruktion i hvordan den anvendes i en nødsituation.

Når du får din EpiPen, ligger den i et hårdt plasticrør. Du bør altid opbevare din EpiPen i plasticrøret, fordi det beskytter den mod slag og lys, som kan nedbryde adrenalin.

## Sådan bruger du din EpiPen



Det er let at anvende EpiPen. Du behøver ikke tage tøjet af, men du skal sørge for, at den orange spids ikke rammer spænder, lynlåse, knapper eller tykke syninger i tøjet.

Tag din EpiPen ud af plasticrøret ved at skubbe rørets låg op, vende røret og lade EpiPen glide ud.

1. Tag fat om din EpiPen med den hånd, du normalt skriver med – og sørg for, at den orange spids peger nedad.
2. Fjern den blå sikkerhedslås, så din EpiPen er klar til brug. Hold den orange spids omkring 10 cm. fra ydersiden af dit lår.
3. Stød den orange spids ind i låret i en 90 graders vinkel – og hold den fast, ind mod låret, i 10 sekunder.
4. Fjern EpiPen, og massér injektionsstedet i mindst 10 sekunder.
5. Efter brug trækker den orange spids sig automatisk ud over nålen. Derfor ser du ikke nålen hverken før, under eller efter brug.

Du – eller en person i nærheden – skal ringe 1-1-2, spørge efter en ambulance og sige anafylaksi. Det er vigtigt, at du ikke rejser dig eller bevæger dig rundt, når du har brugt EpiPen. Bliv liggende eller siddende, og få nogen til at blive hos dig, indtil en læge har set på dig.

Bevidstløse patienter skal placeres på siden i aflåst sideleje.

Du kan kun bruge din EpiPen én gang, så giv den brugte EpiPen til lægen, når han eller hun har undersøgt dig.

Hvis du ikke får det bedre, har du måske brug for endnu en injektion med en EpiPen. Du må bruge din anden EpiPen 5-15 minutter efter den første indsprøjtning.

#### Kend symptomerne

Du bør straks bruge din EpiPen, hvis du tror, du har været i kontakt med det, du er allergisk overfor og oplever alvorlige symptomer.

Hvad skal du være opmærksom på?

Besværet eller højlydt vejrtrækning

Hævet tunge

Hævelse eller tæthed i halsen

Hvæsende eller vedvarende hoste

Bevidstløshed eller ildebefindende

Eller når små børn bliver blege eller slappe

#### **Til sidst vil vi gennemgå de væsentligste punkter for brug af EpiPen:**

Hav altid 2 EpiPenne med dig

Lær dine symptomer at kende, så du ved, hvornår du skal bruge EpiPen

Fjern den blå sikkerhedslås, peg den orange spids mod låret

Tjek gennemsynsvinduet jævnlige for at sikre, at opløsningen er klar og farveløs

Tjek udløbsdatoen. Hvis datoen er overskredet, skal du hurtigst muligt kontakte din læge, så du kan få en ny pen.

Ring 1-1-2, når du har anvendt din EpiPen.

Blive liggende eller siddende, indtil en læge har undersøgt dig.

En EpiPen kan bruges én gang. Aflever den brugte eller udløbne EpiPen på apoteket.

For yderligere information, læs indlægssedlen, som følger med din EpiPen, eller besøg hjemmesiden [www.medicininfo.dk](http://www.medicininfo.dk) brug adgangskoden **epipen2015**.

Kontakt din praktiserende læge eller dit lokale apotek, hvis du har spørgsmål om din EpiPen.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk) eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

September 2017

## Erklæring

Meda AS erklærer herved, at den information, som er tilgængelig på [www.epipen.dk](http://www.epipen.dk), er i overensstemmelse med det danske uddannelsesmateriale, som er indsendt til Lægemiddelstyrelsen og der refereres på hjemmesiden ikke til anden information eller linkes til andre hjemmesider.

Dato: 25. september 2017



Liselotte Kok Rasmussen  
Regulatory consultant  
Meda AS