

Patientkort

Dette patientkort er påkrævet, som en betingelse i markedsføringstilladelsen for tocilizumab, og indeholder vigtig information om sikkerhed, som du, som patient, eller forældre/værge skal være opmærksom på før og under behandling med tocilizumab. Dette patientkort skal læses sammen indlægssedlen for tocilizumab, som kommer med din medicin (og kan også findes på indlægsseddel.dk), da den også indeholder vejledning om, hvordan du skal tage tocilizumab.

Opbevar dette kort på dig i mindst 3 måneder efter din eller dit barns sidste behandling med tocilizumab. Der kan opstå bivirkninger i nogen tid efter den sidste behandling. Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, og tidligere har fået behandling med RoActemra®, skal du kontakte lægen.

Dato for behandling med RoActemra® (tocilizumab)*:

Start: _____

Seneste behandling: _____

Administrationsvej:

Intravenøs infusion ☐

Subkutan injektion ☐

Næste behandling: _____

*Det er vigtigt, at du medbringer en liste over anden medicin du eller dit barn får til alle aftaler på hospitalet.

Kontaktinformationer

Patientens navn: _____

Lægens navn: _____

Lægens tlf.nr: _____

RoActemra® (tocilizumab) Patientkort

Dette patientkort indeholder vigtig information om sikkerhed, som du, som patient, eller forældre/værge skal være opmærksom på før og under behandling med tocilizumab.

- Vis altid kortet til læger og sundhedspersonale, der behandler dig eller dit barn

Dette patientkort skal læses sammen med indlægssedlen for tocilizumab som kommer med din medicin (og kan også findes på indlægsseddel.dk), da den også indeholder instruktion om, hvordan du skal tage tocilizumab.

Infektioner

Du eller dit barn må ikke få tocilizumab, hvis du eller dit barn har en aktiv alvorlig infektion. Tidligere infektion kan blusse op under behandling med tocilizumab.

- Tal med lægen eller andet sundhedspersonale, om eventuelle vaccinationer du eller dit barn kan have behov for at få, inden behandlingen med tocilizumab påbegyndes
- Patienter og forældre/værge for sJIA- og pJIA-patienter bør søge lægehjælp, hvis der opstår symptomer/tegn (såsom vedvarende hoste, vægtøgning/vægttabt, mild feber), som kunne tyde på tuberkulose under eller efter behandling med tocilizumab. Du eller dit barn bør være screenet for tuberkulose og fundet negativ inden behandling med tocilizumab påbegyndes
- Mindre børn kan have svært ved at forklare deres symptomer, og forældrene/værgen skal derfor straks kontakte lægen, hvis barnet uden umiddelbar grund har det skidt.
- Hvis du eller dit barn har en infektion (også selvom det bare er en forkølelse), når det er tid til næste behandling, skal du tale med lægen om behandlingen bør udsættes

Komplikationer ved betændelse i udposninger i mave-tarmkanalen

Patienter, der bruger tocilizumab, kan udvikle divertikulitis (komplikationer ved betændelse i udposninger i mave-tarmkanalen), som kan blive alvorlig, hvis det ikke behandles.

- **Søg straks lægehjælp**, hvis du eller dit barn udvikler mavesmerter eller kolik med ændret afføringsmønster, eller hvis der er blod i afføringen.
- Informer lægen hvis du eller dit barn har, eller tidligere har haft, sår i mavetarmkanalen eller divertikulitis.

Levertoksicitet

Hvis du har en leversygdom, bør du tale med din læge. Din læge vil måske tage en blodprøve for at undersøge din leverfunktion, før du får tocilizumab.

Leverproblemer: Det er almindeligt at se stigninger i et bestemt resultat af blodprøven, som kaldes leverenzymen, hos patienter, der får tocilizumab. Du vil blive fulgt tæt med blodprøver for at se, om der er ændringer i niveauet af leverenzymen, mens du får tocilizumab, og din læge vil træffe de nødvendige foranstaltninger.

I sjældne tilfælde har patienter oplevet alvorlige og livstruende leverproblemer, hvoraf nogle har krævet en levertransplantation.

Sjældne bivirkninger, som kan ses hos 1 ud af 1.000 patienter, er betændelse i leveren (hepatitis) og gulsot. En meget sjælden bivirkning, som kan ses hos 1 ud af 10.000 patienter, er leversvigt.

Du skal straks kontakte lægen, hvis du opdager gulfarvning af hud eller øjne, hvis du får mørkebrun-farvet urin, smerter eller hævelser i den øverste højre side af maven, eller hvis du føler dig meget træt og forvirret. Det er ikke sikkert, du får nogle symptomer, men så vil lægen kunne se det på stigning i leverenzymen i din blodprøve.

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen, sygeplejersken eller apoteket hvis du eller dit barn har spørgsmål eller nogle problemer.

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din/ barnets læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, se indlægsseddel. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Dette patientkort er påkrævet, som en betingelse i markedsføringstilladelsen for tocilizumab, og indeholder vigtig information om sikkerhed, som du, som patient, eller forældre/værge skal være opmærksom på før og under behandling med tocilizumab. Dette patientkort skal læses sammen med indlægssedlen for tocilizumab, som kommer med din medicin (og kan også findes på indlægsseddel.dk), da den også indeholder vejledning om, hvordan du skal tage tocilizumab.