

Patientkort

Zoledronsyre Aristo

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Zoledronsyre Aristo infusionsvæske for kræftrelaterede tilstande.

Din læge har anbefalet, at du får Zoledronsyre Aristo infusionsvæske for at hjælpe med at forebygge knoglekomplikationer (fx knoglebrud) forårsaget af knoglemetastaser, eller knoglekræft eller for at nedsætte mængden af calcium i blodet hos voksne patienter, hvor det er for højt som følge af tilstedeværelse af en tumor.

En bivirkning kaldet osteonekrose i kæberne (ONJ) (knogleskade i kæberne) er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde hospatienter, der modtog Zoledronsyre Aristo for kræftrelaterede tilstande. Osteonekrose i kæberne kan også opstå efter behandlingen er stoppet.

For at mindske risikoen for udvikling af osteonekrose i kæberne, er der nogle forholdsregler, du bør tage:

Før du starter behandling:

- Bed din læge om at fortælle dig om osteonekrose i kæberne før du starter behandling.
- Check med din læge om tandlægeundersøgelse er nødvendig, før du starter behandling med Zoledronsyre Aristo.
- Fortæl din læge/sygeplejerske (sundhedspersonale), hvis du har nogle problemer med din mund eller tænder.

Patienter, der får foretaget tandoperation (fx tandudtrækninger), som ikke får regelmæssige tandeftersyn eller har sygdomme i tandkødet, er rygere, er i forskellige typer kræftbehandling eller som tidligere blev behandlet med bifosfonater (brugt til behandling eller forebyggelse af knoglesygdomme) kan have højere risiko for udvikling af osteonekrose i kæberne.

Mens du er i behandling:

- Du skal opretholde god mundhygiejne og sikre dig, at dine tandproteser passer ordentligt og at du får foretaget regelmæssige tandeftersyn.
- Hvis du får tandbehandling eller skal have foretaget en tandoperation (fx tandudtrækninger), skal du informere din læge og fortælle din tandlæge, at du er behandling med Zoledronsyre Aristo.
- Kontakt straks din læge eller tandlæge, hvis du oplever nogle problemer med din mund eller tænder såsom løse tænder, smerter eller hævelse, ikke-helende sår eller betændelsesudflåd, da dette kan være tegn på osteonekrose i kæberne.

Læg indlægssedlen for yderligere information