

Oslo, 18.10.2020

Vejledning til sundhedspersonale

Uddannelsesmateriale, der beskriver hvordan Ventizolve® skal bruges

Formålet med denne informationsfolder er, at:

- give kortfattet information til sundhedspersonale om Ventizolve 1,26 mg næsespray, opløsning i enkeltdosisbeholder
- hjælpe sundhedspersonale med oplæringen af patienter, som er i risiko for at tage en overdosis af opioider, i brugen af Ventizolve næsespray
- denne oplæring er også tiltænkt deres familier og/eller venner (omsorgspersoner), hvis relevant

Uddannelsesmateriale for Ventizolve består af:

1. Vejledning til sundhedspersonale (dette dokument)

En vejledning for sundhedspersoner med instruktioner om Ventizolve, bestående af:

- Information til sundhedspersonale
- Patientinformationskort, der viser brugen af Ventizolve næsespray til patienter og omsorgspersoner

2. Patientinformationskort

- Patientinformationskortet er til patienter eller omsorgspersoner som de kan tage med hjem.
- Kortet giver information til patienter og omsorgspersoner om Ventizolve næsespray og hvordan næsesprøven bruges i nødstilfælde ved formodet overdosering af opioider.
- Kortet har også en QR-kode som kan anvendes til at tilgå en video via en smartphone.

3. Adgang til online uddannelsesmateriale (www.ventizolve.com)

- Video, som viser, hvad du skal gøre ved formodet opioidoverdosis
- Link til kundeservice for at bestille flere eksemplarer af uddannelsesmateriale

ANDEN INFORMATION OM VENTIZOLVE OG DETS BRUG

1 Ventizolve-pakning indeholder:

- Et plastetui med 2 enkeltdosisbeholdere (næsesprays). Den anden næsespray er inkluderet for at kunne give yderligere en dosis med naloxon, hvis det er nødvendigt
- En hurtig startvejledning med piktogrammer er inkluderet i plastetuiet, som viser, hvordan Ventizolve bruges
- En indlægsseddel med information om lægemidlet og trinvis instruktion vedrørende brugen

INSTRUKTION TIL SUNDHEDSPERSONALE

Hver næsespray afgiver 1,26 mg naloxon (som hydrochloriddihydrat) i en 0,1 ml opløsning. Den er beregnet til omgående administration som akutbehandling af kendt eller formodet opioidoverdosis, manifesteret ved respiratorisk depression og/eller depression af centralnervesystemet, både på hospitaler/lægeklinikker og uden for disse.

Virkningsmekanisme: Naloxon er et semisyntetisk morfinderivat (N-allyl-noroxymorfon). Det er en specifik opioidantagonist, som virker kompetitivt ved opioidreceptorerne. Virkningen skyldes antagonisme af opioidreceptorerne μ , κ og δ . Respirationen genoprettes ved antagonisme af μ -receptoren. Naloxon har ikke agonistiske egenskaber og ved fravær af opioider udviser det i praksis ingen farmakologisk aktivitet.

Brug af naloxon: Ventizolve er et alternativ til de intravenøse, intramuskulære eller subkutane injektioner, som allerede er velkendt blandt sundhedspersonale. Der er i mange europæiske lande stigende erfaring med at give naloxon direkte til personer med risiko for opioidoverdosis inklusive familie og omsorgspersoner via et «tag-med hjem» naloxonprogram (THN)^{2,3,4} baseret på målrettet oplæring.

Ventizolve er et behandlingsalternativ, som kan benyttes indenfor lokale retningslinjer for behandling af denne patientgruppe.

Farmakokinetiske data har vist, at naloxon absorberes i tilstrækkelig grad gennem næseslimhinden til at udvise en antagonistisk virkning på opioider, som har forårsaget symptomer på overdosis.⁵ Patienten forventes at reagere indenfor 2-3 minutter efter administration.¹

VIGTIG INFORMATION OM BRUGEN AF VENTIZOLVE, SOM SKAL DELES MED PATIENTER/OMSORGPERSNER. DENNE INFORMATION ER OGSÅ INKLUDERET I PATIENTINFORMATIONSKORTET.

Ved mistænkt overdosis: Hvis der er mistanke om overdosis hos en komatøs patient, måske fordi der ligger injektionsudstyr rundt omkring, bør omsorgspersonen nærme sig med forsigtighed, tjekke respons, luftveje og vejtrækning, samt tegn på overdosis.

Ring efter hjælp: Ring efter en ambulance (ring 112) med det samme og før Ventizolve administreres, også selvom patienten vågner op.

- Da naloxon er en korttidsvirkende antagonist kan effekten aftage, især hvis patienten har taget et langtidsvirkende opioid, som virker længere end effekten af naloxon.
- Alternativt vil patienten have behov for medicinsk hjælp, hvis brug af opioider ikke er årsagen til symptomerne.

Korrekt brug af Ventizolve: Ventizolve leveres i en klargjort spray til indgivelse i næseboret.

- Når den er indsat i næseboret, aktiveres spraysen ved at trykke ned på stemplet, indtil det siger klik.
- Næsespraysen må ikke primes eller testes før brug, da dosis ellers vil gå tabt. Da der er 2 næsesprays, vil korrekt brug af den første spray, og derefter den anden om nødvendigt, give en større chance for at patienten reagerer, inden hjælpen når frem.

Bliv hos patienten indtil ambulancefolkene ankommer: Ventizolve er ikke en erstatning for akut lægehjælp (såsom HLR (hjertelungeredning)).

- Hvis omsorgspersonen venter sammen med patienten, kan vedkommende lægge patienten i aflåst sideleje. Giv den anden dosis, hvis patienten ikke reagerer på den første dosis, eller falder tilbage til respirationsdepression. Giv hjertelungeredning og overvåg patienten for tilbagevendende respirationsdepression eller abstinenssymptomer. Fortæl ambulancefolkene hvad der er sket.

Tilbagefald af respirationsdepression: Dette er en potentielt livstruende hændelse. 2 næsesprays er inkluderet i plastetuiet for at forlænge effekten af naloxon, indtil lægehjælpen ankommer. Men det er ekstremt vigtigt at ringe efter en ambulance med det samme for at forbedre patientens chance for at komme sig efter indtagelse af opioider.

Risikoen for at udløse opioidabstinenssymptomer: Hos personer med fysisk opioidafhængighed, kan naloxon udløse moderate til alvorlige abstinenssymptomer, som opstår inden få minutter efter administration og kan aftage efter ca. 2 timer.

- Alvorlighed af abstinenssymptomerne afhænger af naloxondosen, samt graden af og typen af opioidafhængighed. Nogle personer kan opføre sig aggressivt når de vågner op.

Patientinformationskortet til patienter og omsorgspersoner, der er en del af uddannelsesmateriale for Ventizolve, kan bruges af sundhedspersonalet til at gennemgå disse emner med patienter og omsorgspersoner på en enkel og trinvis måde og benytter de samme punkter som i den hurtige startvejledning der er inkluderet i etuiet. Derudover er der et link til en kort undervisningsvideo, som giver en omfattende gennemgang af behandlingsproceduren.

Indberetning af bivirkninger


Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, se produktresuméet på www.produktresume.dk

Med venlig hilsen



Nina Kristin Måsvær
Markedschef dne pharma as

001/v01/DK




For mere information besøg www.ventizolve.com eller scan QR koden:

Referanser:

1. Produktresumé for Ventrizolve; www.produktresume.dk
2. European Monitoring Centre for Drug Addiction, European Drug Report, 2017
3. Bird SM et al Effectiveness of Scotland's National Naloxone Programme for reducing opioid-related deaths: Addiction. 2016 May; 111(5): 883-91
4. Madah-Amiri D et al Rapid widespread distribution of intranasal naloxone for overdose prevention. Drug Alcohol Depend. 2017 Apr 1; 173: 17-23
5. Mundin G, et al Pharmacokinetics of concentrated naloxone nasal spray over first 30 minutes postdosing. Addiction. 2017 Sep; 112(9): 1647-1652.

Hvordan **Ventizolve**[®] bruges i tilfælde af en overdosis



Ventizolves virkning og anvendelse

Ventizolve® anvendes til at ophæve virkningen af kendt eller mistænkt opioidoverdosis hos voksne (f.eks. morfin, heroin, metadon, fentanyl, oxycodon eller buprenorphin), især hos personer med risiko for abstinenssymptomer.

Ventizolve® er en næsespray, der anvendes til akut behandling af opioidoverdosis eller mulig opioidoverdosis hos voksne. Tegn på overdosis omfatter:

- vejrtrækningsproblemer
- svær søvnighed
- ingen reaktion på høj lyd eller berøring.

Hvis du har risiko for at få en opioidoverdosis, skal du altid have Ventizolve® på dig.

Ventizolve® virker i kort tid og alene for at ophæve virkningen af opioider, mens du venter på lægehjælp. Det er ikke en erstatning for akut lægehjælp.

Fortæl altid din familie og venner, at du har Ventizolve® på dig.

the 1990s, the number of publications on the topic has increased. The number of publications in the field of research on the effects of the environment on mental health has increased from 10 in 1990 to 119 in 2003.

The present study is a review of the literature on the effects of the environment on mental health. The review is based on a search of the literature in the field of research on the effects of the environment on mental health. The search was conducted in the following databases: Medline, PsycInfo, Sociofile, and ERIC. The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language. The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

The search was limited to the period 1990-2003. The search was limited to the English language.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel anvendes til akut behandling af opioidoverdosis og skal gives af en anden end dig selv.

Ventizolve® skal gives med det samme og erstatter ikke akut lægehjælp.

**Ring efter en ambulance med det samme, også selvom personen vågner op.
RING 112.**

Én næsespray med Ventizolve® indeholder kun én dosis af naloxon.

Det er vigtigt, at næsesprayen ikke primes eller testes for brug, da dette vil tømme næsesprayen og du ikke vil modtage det lægemiddel, du har brug for. Brug den næste Ventizolve® næsespray hvis det er nødvendigt med flere doser. Yderligere doser kan gives 2 til 3 minutter efter den første dosis.

Brugsvejledning

1

Tjek symptomer og reaktion

• **Tjek for reaktion for at se, om personen er ved bevidsthed.** Du kan råbe personens navn, forsigtigt ruske i skuldrene, tale højt ind i øret, gnide på brystbenet (sternum), knibe øret eller kanten af fingerneglen.

• **Tjek luftveje og åndedræt.**

Sørg for at mund og næse ikke er blokeret. Overvåg åndedrættet i 10 sekunder – bevæger brystkassen sig? Kan du høre åndedrættet? Kan du føle åndedrættet mod din kind?

• **Tjek tegn på overdosis**, såsom: ingen reaktion på berøring eller lyde, langsom uregelmæssig vejrtrækning eller ingen vejrtrækning, snorken, gispen eller synkebevægelser, blå eller lilla farve på fingernegle eller læber.

Hvis overdosis mistænkes, skal Ventizolve® gives.


2

Ring efter en ambulance.
RING 112.




5

Støt nakken idet hovedet lænes tilbage.
Indsæt dysen i det ene næsebor. Tryk kraftigt ned på stemplet, indtil det siger klik, for at afgive dosis. Fjern derefter næsesprayen fra næseboret.



3

Læg patienten på ryggen. Sørg for at luftvejene er frie. Det anbefales at undersøge næseboret og fjerne eventuel tilstopning, før næsesprayen gives.




4

Åbn den indre emballage ved først at fjerne gummibåndet og derefter trykke på midten af de flade sider af plastikdelen.




6

Læg patienten i aflåst sideleje. Bliv hos patienten indtil ambulancen ankommer. Se efter forbedring i patientens vejrtrækning, opmærksomhed og reaktion på støj og berøring.



7

Hvis der ikke ses forbedring, skal næste dosis gives efter 2-3 minutter i det andet næsebor.



Husk

- Tiden er vigtig! Tøv ikke med at yde førstehjælp og med at bruge Ventizolve®
- Start altid med at sikre frie luftveje og ring efter en ambulance
- Du kan ikke skade en person ved at give dem Ventizolve® næsespray
- Der er ingen risiko for, at du skader dig selv ved at give næsesprayen til en anden person
- Indeni hver plastbeholder er der en hurtig startvejledning.

For mere information besøg
www.dk.ventizolve.com
eller scan QR koden





002/v01/DK



dne pharma as
Karihaugveien 22
1086 Oslo – Norway

+47 21 60 87 00
post@dnepharma.com
dnepharma.com

Business registry/
Foretaksregisteret:
NO 991 741 208 MVA

Danish Script Ventizolve video

Original Picture in Norwegian	Norwegian text	Danish text and voice
 <p>Hvordan respondere på en opioidoverdose ved å bruke Ventizolve</p>	<p><i>Text and voice:</i> <i>Hvordan respondere på en opioidoverdose ved å bruke Ventizolve</i></p>	<p>Text and voice: Hvordan du skal reagere på en opioidoverdosis ved at bruge Ventizolve.</p>
 <p>En overdose kan være en livstruende situasjon, og da er det viktig å reagere raskt.</p>	<p><i>Text:</i> <i>En overdose kan være en livstruende situasjon, og da er det viktig å reagere raskt.</i></p>	<p>Text and voice: En overdosis kan være en livstruende situation, så det er vigtigt at reagere hurtigt.</p>

<p>Ventizolve er en neseppray, som inneholder nalokson, og er en motgift til opioider.</p> <p>Ventizolve brukes til akuttbehandling av kjente eller mistenkte opioidoverdoser hos voksne.</p> 	<p><i>Text:</i> Ventizolve er en neseppray, som inneholder nalokson, og er en motgift til opioider.</p> <p><i>Ventizolve brukes til akuttbehandling av kjente eller mistenkte opioidoverdoser hos voksne.</i></p> <p><i>Voice:</i> Denne filmen er ment å gi deg konkret informasjon om hvordan du best kan respondere på en mistenkt eller kjent opioid overdose.</p>	<p>Text and voice: Ventizolve er en næsespray, som inneholder naloxon, og er en motgift mod opioider.</p> <p>Ventizolve anvendes til akut behandling af kendt eller mistænkt opioidoverdosis hos voksne.</p> <p>Voice: Denne film er beregnet til at give dig konkrete oplysninger om, hvordan du bedst reagerer på en mistænkt eller kendt opioidoverdosis.</p>
<p>Morfin Heroin Metadon Fentanyl Oksykodon Buprenorfin</p> 	<p><i>Voice:</i> Opioider er for eksempel morfin, heroin, metadon, fentanyl, oksykodon eller buprenorfin</p> <p><i>Text:</i> Morfin, Heroin, Metadon, Fentanyl, Oksykodon, Buprenorfin</p> <p><i>Voice:</i> Disse finnes også som reseptpliktige medisiner som vanligvis brukes mot smerte.</p>	<p>Voice: Opioider er for eksempel morfin, heroin, metadon, fentanyl, oxycodon eller buprenorphin</p> <p>Text: Morfin, Heroin, Metadon, Fentanyl, Oxycodon, Buprenorphin</p> <p>Voice: Disse stoffer er også tilgjengelige som reseptpliktig medicin, der ofte brukes mod smerte.</p>

	<p><i>Text:</i> Hvordan bruke Ventizolve</p>	<p>Text: Hvordan Ventizolve brukes</p>
<p>1.</p> <p>Sjekk for symptomer og respons</p>  <p>00:45</p>	<p><i>Text:</i> 1. Sjekk for symptomer og respons</p> <p><i>Voice:</i> Først må du se etter symptomer og om du oppnår respons, for å se om personen er bevisst. Ved mistanke om overdose skal Ventizolve gis</p>	<p>Text: 1. Tjek for symptomer og reaktion.</p> <p>Voice: Tjek først etter symptomer på overdose, og om du oppnår en reaktion med lyde og berøring, for at se om personen er bevidst. Ved mistanke om en overdose skal der gives Ventizolve.</p>

1.

Howdan bruke
Verstolva

Sjekk for symptomer og respons

- a. Rop navnet til vedkommende
- b. Rist forsiktig i skuldrene
- c. Snakk høyt inn i øret
- d. Gni brystbeinet hardt slik at det skal gjøre vondt
- e. Klipp i øret eller fingerneglfestet
- f. Sjekk luftveiene og pusting



Text :

- Rop navnet til vedkommende
- Rist forsiktig i skuldrene
- Snakk høyt inn i øret
- Gni brystbeinet hardt slik at det skal gjøre vondt
- Klype i øret eller fingerneglfestet.
- Sjekk luftveiene og pusting

Voice:



- Rop navnet til vedkommende
 - Rist forsiktig i skuldrene
 - Snakk høyt inn i øret
 - Gni brystbeinet hardt slik at det skal gjøre vondt
 - Klype i øret eller fingerneglfestet.
 - Sjekk luftveiene og pusting
 - Rens munnen og nesen for eventuelle blokkeringer.
- Kontroller pusten i 10 sekunder - beveger brystet seg? Kan du høre pustelyder? Kan du føle pusten på kinnet?



Text:



- Råb personens navn.
- Rusk skuldrene forsiktig.
- Tal højt ind i øret.
- Gnid brystbenet hårdt, så det gør ondt.
- Knib øret eller kanten af fingerneglen.
- Tjek luftveje og åndedræt.



Voice:

- Råb personens navn.
- Rusk skuldrene forsigtigt.
- Tal højt ind i øret.
- Gnid brystbenet hårdt, så det gør ondt.
- Knib øret eller kanten af fingerneglen.
- Tjek luftveje og åndedræt.
- Rengør munden og næsen for eventuelle tilstopninger. Overvåg åndedrættet i 10 sekunder - bevæger brystkassen sig? Kan du høre åndedrættet? Kan du mærke åndedrættet mod din kind?

<p>1.</p> <p>Tegn på overdose kan være:</p> <p>a. Ingen respons på berøring eller lyd b. Langsom og ujevn pust eller ingen pust c. Snorking, gispning eller gulping d. Blå eller lilla fingerneglar eller lepper</p> <p>Hvordan bruke Ventizolve</p> 	<p><i>Text and voice:</i></p> <p><i>Tegn på overdose kan være:</i></p> <p>a) ingen respons på berøring eller lyd b) langsom og ujevn pust eller ingen pust c) snorking, gispning eller gulping d) blå eller lilla fingerneglar eller lepper</p>	<p><i>Text and voice:</i></p> <p>Tegn på overdosis kan være:</p> <p>a. ingen reaksjon på berøring eller lyd b. langsom og uregelmæssig vejrtrækning eller ingen vejrtrækning c. snorken, gispnen eller synkebevægelser d. blå eller lilla farve på fingernegle eller læber.</p>
<p>2.</p> <p>Ring 113 for å få hjelp</p> <p>De vil hjelpe deg gjennom de neste stegene mens du venter på at ambulansen skal ankomme.</p> <p>Ventizolve fungerer kun i kort tid. Virkningen av opioider kan komme tilbake mens du venter på nødhjelp</p> 	<p><i>Text:</i></p> <p><i>Ring 113 for å få hjelp</i></p> <p><i>De vil hjelpe deg gjennom de neste stegene mens du venter på at ambulansen skal ankomme.</i></p> <p><i>Ventizolve fungerer kun i kort tid og gjør at virkningene av opioider kan komme tilbake mens du venter på medisinsk nødhjelp</i></p> <p><i>Voice:</i></p> <p><i>Du må nå ringe etter ambulanse. RING 113 for å få hjelp. De vil hjelpe deg gjennom de neste stegene mens du venter på at ambulansen skal ankomme.</i></p> <p><i>Det er svært viktig at du ringer etter hjelp. Ventizolve fungerer kun i kort</i></p>	<p><i>Text:</i></p> <p>RING 112 for hjelp.</p> <p>De vil hjelpe dig gennem de næste trin, mens du venter på, at ambulancen ankommer.</p> <p>Ventizolve virker kun i kort tid og det betyder, at opioidvirkningerne kan vende tilbake, mens du venter på akut lægehjelp.</p> <p><i>Voice:</i></p> <p>Du skal nu ringe efter en ambulance. RING 112 for hjælp. De vil hjelpe dig gennem de næste trin, mens du venter på, at ambulancen ankommer.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du ringer efter hjælp. Ventizolve virker kun i kort tid,</p>

	<p><i>tid og gjør at virkningene av opioider kan komme tilbake mens du venter på medisinsk nødhjelp. Det er derfor ingen erstatning for medisinsk nødhjelp</i></p>	<p>og det betyr, at opioidvirkningerne kan vende tilbake, mens du venter på akut lægehjelp. Det er derfor ingen erstatning for akut lægehjelp.</p>
<p>3.</p> <p>Legg pasienten på ryggen</p> <p>Sikre frie luftveier. Det anbefales å kontrollere neseboret og fjerne eventuell tilstopping før nesesprayen gis.</p>  <p><small>Hvordan</small></p>	<p><i>Text:</i> <i>Legg pasienten på ryggen.</i> <i>Sikre frie luftveier.</i> <i>Det anbefales å kontrollere neseboret og fjerne eventuell tilstopping før nesesprayen gis.</i></p> <p><i>Voice:</i> <i>Du må nå legge pasienten på ryggen.</i> <i>Sikre frie luftveier.</i> <i>Det anbefales å kontrollere neseboret og fjerne eventuell tilstopping før nesesprayen gis.</i></p>	<p><i>Text:</i> Læg patienten på ryggen. Sørg for at luftvejene er frie. Det anbefales at undersøge neseboret og fjerne eventuell tilstopping, før nesesprayen gives.</p> <p><i>Voice:</i> Du skal nu lægge patienten på ryggen. Sørg for at luftvejene er frie. Det anbefales at undersøge neseboret og fjerne eventuell tilstopping, før nesesprayen gives.</p>
<p>4.</p> <p>Åpne emballasjen</p> <p>a. Først fjerne gummibåndet b. Trykke på midten av det flate området på hver side av plastbeholderen.</p>  <p><small>Hvordan Bruke Ventilator</small></p>	<p><i>Text:</i> Åpne emballasjen Først fjerne gummibåndet Trykke på midten av det flate området på hver side av beholderen.</p> <p><i>Voice:</i> Du må nå åpne den indre emballasjen ved å først fjerne gummibåndet og deretter trykke på midten av det flate området på hver side av plastbeholderen.</p>	<p><i>Text:</i> Åbn emballagen. Fjern først gummibåndet. Tryk på midten af det flade område på hver side af beholderen.</p> <p><i>Voice:</i> Du skal nu åbne den indvendige emballage ved først at fjerne gummibåndet og derefter trykke på midten af det flade område på hver side af plastbeholderen.</p>

<p>4.</p> <p>Åpne emballasjen</p> <p>a. Først fjerne gummibåndet b. Trykke på midten av det flate området på hver side av plastbeholderen. c. Det er to nesepærer med nalokson i emballasjen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Ikke prime eller test nesepæren før bruk.</div> 	<p><i>Inne i emballasjen vil du også finne en hurtigveiledning med trinnvis bruksanvisning dersom det er behov for det.</i></p> <p><i>Text:</i> <i>Ikke prime eller test nesepæren før bruk</i></p> <p><i>Voice:</i> <i>Det er to nesepærer med nalokson i emballasjen. Ikke prime eller test nesepæren før bruk. En nesepære Ventizolve inneholder bare én dose nalokson</i></p>	<p>Inde i emballagen vil du også finde en hurtig startvejledning med trin-for-trin instruktioner.</p> <p><i>Text:</i> Du må ikke prime eller teste næsespræen inden brug.</p> <p><i>Voice:</i> Der er to næsesprays med naloxon i emballagen. Du må ikke prime eller teste næsespræen inden brug. Én Ventizolve næsespray indeholder kun én dosis naloxon</p>
<p>5.</p> <p>Avgi dosen</p> <p>a. Støtt opp under nakken slik at hodet kan bøyes bakover. b. Før spissen av nesepæren inn i det ene neseboret. c. Trykk hardt til du hører et klikk.</p> 	<p><i>Text:</i> <i>Avgi dosen</i> <i>Støtt opp under nakken slik at hodet kan bøyes bakover.</i> <i>Før spissen av nesepæren inn i det ene neseboret.</i> <i>Trykk hardt på stempelet til du hører et klikk</i></p> <p><i>Voice:</i> <i>Støtt opp under nakken slik at hodet kan bøyes bakover.</i> <i>Før spissen av nesepæren inn i det ene neseboret.</i> <i>Trykk hardt på stempelet til du hører et klikk for å avgje dosen. Fjern</i></p>	<p><i>Text:</i> Giv den ene dosis. Støt nakken, så hovedet kan bøjes bagover. Indfør spidsen af næsespræen i det ene næsebor. Tryk hårdt ned på stemplet, indtil du hører et klikk.</p> <p><i>Voice:</i> Støt nakken, så hovedet kan bøjes bagover. Indfør spidsen af næsespræen i det ene næsebor. Tryk hårdt ned på stemplet, indtil du hører et klik, for at afgive dosis.</p>

	<p><i>spissen av nesepøyen fra neseboret etter at dosen er gitt.</i></p>	<p>Fjern derefter næsesprayen fra neseboret.</p>
<p>6.</p> <p>Legg pasienten i stabilt sideleie</p> <p><small>Bli hos pasienten inntil ambulansepersonell ankommer</small></p> 	<p><i>Text;:</i> <i>Legg pasienten i stabilt sideleie. Bli hos pasienten inntil ambulansepersonell ankommer.</i></p> <p><i>Voice:</i> <i>Legg pasienten i stabilt sideleie. Bli hos pasienten inntil ambulansepersonell ankommer. Se etter forbedring av pasientens pust, bevissthet og respons på lyder og berøring.</i></p>	<p>Text: Læg patienten i aflåst sideleje. Bliv hos patienten indtil ambulancen ankommer.</p> <p>Voice: Læg patienten i aflåst sideleje. Bliv hos patienten indtil ambulancen ankommer. Se efter forbedring i patientens vejrtrækning, bevidsthed og reaktion på lyde og berøring.</p>
<p>7.</p> <p>Avgi neste dosen</p> <p><small>Om pasienten ikke blir bedre skal neste dose gis i det <u>andre</u> neseboret etter 2 til 3 minutter.</small></p> 	<p><i>Text:</i> <i>Avgi neste dose</i> <i>Om pasienten ikke blir bedre skal neste dose gis i det <u>andre</u> neseboret etter 2 til 3 minutter</i></p> <p><i>Voice:</i> <i>Om pasienten ikke blir bedre skal neste dose gis i det <u>andre</u> neseboret etter 2 til 3 minutter</i></p>	<p>Text: Giv den næste dosis. Hvis patienten ikke får det bedre, skal neste dosis gives i det <u>andet</u> næsebor efter 2-3 minutter.</p> <p>Voice: Hvis patienten ikke får det bedre, skal neste dosis gives i det <u>andet</u> næsebor efter 2-3 minutter.</p>

Dersom du eller en du er omsorgsperson for risikerer en opioid overdose, eller du kan bli vitne til en overdose i ditt daglige liv, bør du alltid ha nalokson neseppray tilgjengelig.



*Text and voice:
Dersom du eller en du er omsorgsperson for risikerer en opioid overdose, eller du kan bli vitne til en overdose i ditt daglige liv, bør du alltid ha nalokson neseppray tilgjengelig.*

Text and voice:
Hvis du, eller én du er omsorgsperson for, er i risiko for en opioidoverdosis, eller du kan blive vidne til en overdosis i dit daglige liv, bør du altid sørge for at have en naloxon næsespray tilgjengelig.

Ventizolve
Naloxone

dne pharma



*Text:
Ventizolve
nalokson*

Text:
Ventizolve
Naloxon