

# Ogluo<sup>®</sup>

## injektion, glukagon

**Ogluo<sup>®</sup>** 0,5 mg injektionsvæske,  
opløsning, i fyldt pen (glukagon)

---

**Ogluo<sup>®</sup>** 1 mg injektionsvæske,  
opløsning, i fyldt pen (glukagon)

### ADMINISTRATIONSBRUCHURE

Vigtige oplysninger til sikker og effektiv brug

Udstedelsesdato: December 2022


## Om Ogluo® Fyldt pen og denne Administrationsbrochure

- Ogluo® fyldt pen anvendes til behandling af meget lavt blodsukker (kendt som alvorlig hypoglykæmi) hos voksne, unge og børn (2 år og derover), der diagnosticeres med diabetes.
- Denne Indgivelsesvejledning forklarer, hvordan man bruger Ogluo® fyldt pen.
- Læs pakkens indlægsseddel for at få alle produktoplysninger og se instruktionsvideoen. Begge er tilgængelige på: [www.Ogluo.info](http://www.Ogluo.info)
- Del disse oplysninger med plejepersonalet eller venner/kolleger, som du mener bør være i stand til at hjælpe dig, hvis du skulle få meget lavt blodsukker og have brug for hjælp.
- Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om særlige advarsler og forholdsregler, som du bør være opmærksom på ved brug af Ogluo® fyldt pen. Hvis du er usikker på nogle af oplysningerne, skal du kontakte dit sundhedspersonale.
- Du og/eller plejepersonalet bør informeres om de potentielle behandlingsrisici.
- Du kan få flere oplysninger og en instruktionsvideo på [ogluo.eu](http://ogluo.eu) eller ved at scanne denne QR-kode






## Indgivelse


- Gem denne administrationsbrochure, også efter at din læge har instrueret dig i at bruge Ogluo® fyldt pen (da du muligvis vil have behov for at læse den igen på et senere tidspunkt).
- Fjern ikke 'Ogluo® fyldt pen' fra foliepakningen før brug.
- Afprøv ikke 'Ogluo® fyldt pen' før brug, da hver enhed kun kan bruges én gang.
- Hvis der ikke forekommer nogen virkning inden for 15 minutter, kan det være nødvendigt at indgive en ekstra dosis fra en ny forfyldt pen.
- Denne indgivelsesvejledning kan bruges til oplære mennesker omkring dig, hvordan de håndterer og administrerer Ogluo® fyldt pen korrekt.
- Nedenstående diagram giver en kort anvisning i hvordan man bruger Ogluo® fyldt pen.
- For at forhindre et tilbagefald af hypoglykæmi bør der gives orale kulhydrater for at genoprette leverglykogen, når patienten har reageret på behandlingen.



## 1. Klargør



## 2. Injicér



## 3. Hjælp



Efter injektionen låses den gule kanylebeskyttelse over kanylen.

- Se indlægssedlen for at få alle oplysninger om indgivelse og brug af Ogluo® fyldt pen.

## Særlige advarsler og forholdsregler ved brug

### Vær opmærksom på, at:

Ogluo® muligvis ikke vil virke korrekt, hvis:

- du har fastet eller ikke spist for nylig eller har haft et lavt blodsukkerniveau i lang tid
- du har et lavt niveau af adrenalin
- du har lavt blodsukker forårsaget af at drikke for meget alkohol
- du har en tumor, der frigiver glukagon eller insulin.
- Hvis du er usikker på noget af dette, bedes du spørge sundhedspersonalet.

## Generelle påmindelser

### Når du har fået ordineret Ogluo® fyldt pen, skal du sørge for:

- at give dine familiemedlemmer, kolleger, og dine nærmeste venner besked om Ogluo® fyldt pen, samt hvornår og hvordan den indgives.
- altid at have Ogluo® fyldt pen på dig.
- at du ved, hvordan Ogluo® fyldt pen opbevares korrekt.
- at du ikke er overfølsom over for glukagon eller nogen af de andre ingredienser i Ogluo® fyldt pen.
- at du ikke har en tumor i din binyre (fæokromocytom).

Flere eksemplarer af denne vejledning og andre materialer kan bestilles via:

Telefon: 0330 1359 433

E-Mail: [medinfo@Tetrispharma.com](mailto:medinfo@Tetrispharma.com)

Onlin: [www.Ogluo.info](http://www.Ogluo.info)

Du kan få flere oplysninger og en videovejledning på [www.Ogluo.info](http://www.Ogluo.info). eller scan denne QR-kode



## Indberetning af bivirkninger

### Indberet formodede bivirkninger

Det er vigtigt at indberette formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet. Det giver mulighed for fortsat overvågning af forholdet mellem fordele og risici ved lægemidlet.

Formodede bivirkninger bedes indberettes til Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

[www.Ogluo.info](http://www.Ogluo.info)

UGLUODKRMM0001.3

Fremstillingsdato:  
December 2022