

Administration af midazolam næsespray

Instruktionskort til forældre og værger

Januar 2026, v.1.0

- 1 Tag næsesprayen ud af blisterpakningen.
- 2 Hold på næsesprayen ved at anbringe tommelfingeren på anordningens stempel og pege- og langfinger på begge sider af dysen.




Produktet må ikke afprøves, det kan kun bruges én gang!

- 3 Før dysen ind i det ene næsebor, indtil fingrene på fingergrebet berører næsen.



Næsesprayen kan indgives i en hvilken som helst position, også til en patient, der ligger ned eller sidder op.

Det er muligt, at dysen ikke kan føres ind i næseboret hos små børn:



Anbring i det tilfælde dysens spids på næseboret (på grund af den kugleformede spids vil den altid komme ind i næseboret i en eller anden udstrækning), og kontrollér inden indgivelse, at dysen lukker for næseboret.

- 4 Tryk godt ind på stemplet med tommelfingeren.
- 5 Fjern dysen fra næsen. Herefter er næsesprayen tom. For yderligere information om brugen, se indlægssedlen eller www.indlaegssedel.dk.



Vigtigt:

På den anden side findes instruktioner til, hvordan du kontrollerer patientens vejrtrækning efter at midazolam næsespray er givet.



6 Ved behandling af anfald, skal patienten, om muligt, pladsres i aflåst sideleje – det kan være nødvendigt at vente, indtil kramperne er ophørt.

Når patienten er placeret i sideleje, skal patientens mund være helt åben, pege mod jorden og deres hoved vipet tilbage.

Sådan pladsres patienten i aflåst sideleje:

A. Placer den nærmest arm i en højre-vinkel på kroppen med armen bøjet.



B. Før den anden arm over brystet. Læg patientens håndryg mod kinden.



C. Tag fat i det fjerneste ben lige over knæet. Vend patienten mod dig over på siden. Støt hovedet, hold bagsiden af hånden mod kinden.



D. Åbn munden (om muligt), og peg mod jorden, vip hovedet en smule tilbage. Endelig stilling: Hånden støtter hovedet.



7 Kontrol af vejrtrækning

1. Spred fingrene på begge hænder.
2. Placer din ene hånd ved overgangen mellem mave og bryst, og den anden hånd midt på ryggen. Sørg for, at fingrene peger mod patientens hoved.
3. Før dit øre så tæt på patientens hoved som muligt, og kig mod brystkassen/maven. Se, føl og lyt i maksimalt 10 sekunder efter normal vejrtrækning (brystkassen eller maven skal hæve sig 2–3 gange, og du må ikke høre lyde som gurglen, snorken eller rallende vejrtrækning).
4. Gentag ovenstående mindst 2 gange pr. minut.

8 Er vejrtrækningen ikke normal?

Hvis anfaldet ikke stopper inden for 10 minutter efter indtagelse af given dosis - **Ring 112 og følg instruktionerne nøje!**

9 Giv kun en anden dosis, hvis du er blevet instrueret om det.

I dette tilfælde skal du bruge en ny enkeltdosisbeholder og følge instruktionerne i trin 1 til 5 igen. Giv den anden dosis i det andet næsebor, dvs. ikke det, der blev brugt til den første dosis.