

Vigtige kontaktoplysninger

Navn på speciallæge

Telefonnummer på speciallæge

Telefonnummer uden for åbningstid

Mit navn

Mit telefonnummer

Navn på kontakt i nødstilfælde

Telefonnummer på kontakt i nødstilfælde

NP-DK-DST-CRD-250001. 08.08.2025

Patientkort

Jemperli (dostarlimab)

Vigtig sikkerhedsinformation for at mindske risikoen for immunrelaterede bivirkninger

Jemperli kan forårsage bivirkninger, der i nogle tilfælde kan blive alvorlige eller livstruende og kan føre til død. Disse bivirkninger kan forekomme på hvilket som helst tidspunkt under behandling eller efter behandlingen er afsluttet. Du kan opleve bivirkninger flere steder i kroppen på samme tid.

Kontakt din speciallæge straks, hvis du oplever nogen af de anførte bivirkninger, hvis dine symptomer forværres, eller du oplever andre symptomer, der ikke er anført på dette kort. **Hurtig medicinsk behandling kan afholde problemet fra at blive mere alvorligt.** Lægen kan vælge at give anden medicin til at behandle dine symptomer. Din læge kan også vælge at tilbageholde næste dosis af Jemperli eller stoppe behandlingen.

For mere information se indlægssedlen på www.indlaegsseddel.dk eller ring til GSK Medicinsk Information på 36 35 91 00.

VIGTIGT

- Forsøg ikke at diagnosticere eller behandle bivirkninger selv.
- **Hav altid dette kort på dig**, herunder når du rejser, eller hvis du tager på skadestuen, eller hvis du skal tilses af en anden læge.
- Gem dette kort i mindst fire måneder efter den sidste dosis af Jemperli.
- Fortæl sundhedspersoner der tilser dig, at du er i behandling med Jemperli og vis dem dette kort.

Nedenfor er en nyttig liste over symptomer, som du skal overvåge nøje. Kontakt dit onkologiske behandlerteam, hvis du oplever nogle af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver værre.

Lunger

- Åndenød
- Bryst smerter
- Hoste

Mave-tarm system

- Diarré (løs eller hyppig afføring)
- Sort, tjæret, klistret afføring
- Blod eller slim i afføring
- Kraftige smerter eller ømhed i maveregionen

Lever

- Kvalme og/eller opkastning
- Manglende appetit
- Smerter i højre side af maven
- Gulvarvning af huden eller det hvide i øjnene
- Mørk urin (te-farvet)
- Tendens til blødning eller blå mærker oftere end normalt

Nyrerne

- Nedsat urinmængde
- Hævede ankler
- Blodig urin

Huden

- Udslett, kløe, afskalning eller blærer på huden
- Sår i munden, næsen, halsen eller i området ved kønsorganerne

Hormonkirtler

- Hjertebanken
- Vægttab eller vægtøgning
- Synsændringer
- Forøget svedproduktion
- Hårtab
- Kuldefølelse
- Udpræget træthed
- Mere sulten eller tørstig end normalt
- Hyppig vandladning
- Forstoppelse
- Dybere stemme
- Svimmelhed eller besvimelse
- Vedvarende eller usædvanlig hovedpine

Andet

- Kraftige eller vedvarende muskelsmerter
- Forvirring eller hukommelsesproblemer
- Krampeanfald
- Ændringer i humør eller opførsel
- Prikken eller følelsesløshed i arme og ben
- Feber eller influenza-lignende symptomer
- Uregelmæssig hjertebanken

Vigtige oplysninger til sundhedspersoner

Denne patient behandles med Jemperli, som kan forårsage immunrelaterede bivirkninger der kan forekomme når som helst under behandling eller efter endt behandling. Immunrelaterede bivirkninger kan optræde i alle organer eller alt væv og kan påvirke mere end ét system i kroppen på samme tid. Patienter skal vurderes for tegn og symptomer på immunrelaterede bivirkninger, herunder men ikke begrænset til dem, der er anført på dette kort. Tidlig identifikation og håndtering af immunrelaterede bivirkninger er altafgørende for at minimere konsekvenserne af immunrelaterede bivirkninger.

Ved mistanke om immunrelaterede bivirkninger skal patienten evalueres for at bekræfte ætiologien eller udelukke andre årsager. På baggrund af bivirkningens sværhedsgrad skal behandlingen med Jemperli tilbageholdes eller seponeres permanent. Kortikosteroider eller anden relevant behandling bør administreres.

Specifikke retningslinjer for håndtering af immunrelaterede bivirkninger er tilgængelige i produktresuméet for Jemperli.

Konsultation med en onkolog eller anden speciallæge kan være nyttig ved håndtering af immunrelaterede bivirkninger.

Disse bivirkninger er ikke de eneste, Jemperli kan forårsage. **Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejersken eller apotekspersonalet.** Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst mulig til Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GSK (dk-info@gsk.com). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden.

For mere information se produktresuméet for Jemperli eller ring til GSK Medicinsk Information på 36 35 91 00.