Patientinformationskort/Spjald fyrir sjúklinga

Apixaban Krka (apixaban)

633641

(DK) **Hav altid dette kort på dig/Dette kort skal altid være med barnet eller omsorgspersonen.**
Vis kortet til apotekspersonalet, tandlægen eller til andre sundhedspersoner, før behandling.
Jeg er i blodfortyndende behandling med Apixaban Krka (apixaban) for at forebygge blodpropper.

KRKA

(IS) **Þetta spjald á alltaf að fylgja þér / barninu / umönnunaraðila**

Sýndu lyfjafræðingi, tannlækni og öðru heilbrigðisstarfsfólki spjaldið áður en þú færð meðferð.

Ég er í segavarnarmeðferð með Apixaban Krka (apixaban) til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa

(DK) **Oplysninger til patienten/omsorgsperson**

- Tag eller giv Apixaban Krka regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en morgendosis, skal du tage eller give den så snart du kommer i tanke om det og det kan tages eller gives med aftendosis. En glemt aftendosis kan kun tages eller gives samme aften. Tag eller giv ikke to doser næste morgen, men fortsæt med at følge doseringsskemaet to gange dagligt som anbefalet næste dag.
- Stop ikke med at tage eller give Apixaban Krka uden først at tale med lægen, da patienten har risiko for at få et slagtilfælde (voksne)/en blodprop (pædiatriske patienter) eller få andre komplikationer.
- Apixaban Krka medvirker til at fortynde blodet. Dette kan imidlertid øge risikoen for blødninger.
- Tegn og symptomer på blødning omfatter blå mærker eller blødning under huden, tjærefarvet afføring, blod i urinen, næseblod, svimmelhed, træthed, bleghed eller svaghedsfølelse, pludselig kraftig hovedpine, ophostning eller opkastning af blod.
- Hvis blødningen ikke stopper af sig selv, **skal du straks søge lægehjælp.**
- Hvis du/patienten skal opereres eller have foretaget andre indgreb, skal du fortælle lægen, at du tager Apixaban Krka/Informer sundhedspersonalet om, at barnet tager Apixaban Krka.

04/2025

Oplysninger til sundhedspersonalet

- Apixaban Krka (apixaban) er et oralt antiokoagulans, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.
- Apixaban Krka kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af major blødning, skal det straks seponeres.
- Behandling med Apixaban Krka kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) frarådes) – se produktresuméet.
- Et middel til at reversere anti-faktor Xa-aktiviteten af apixaban er tilgængeligt for voksne, men dets sikkerhed og virkning er ikke blevet fastslået hos pædiatriske patienter (se andexanet alfa produktresumé).

Venligst udfyld disse felter eller bed lægen om at gøre det/
Fylltu út upplýsingarnar í þessum kafla eða biddu lækninn að gera það

Navn/Nafn: _____

Fødselsdato/Fæðingardagur: _____

Indikation/Ábending: _____

Vægt (for pædiatrisk population)/Þyngd (fyrir börn):

_____

Dosis/Skammtur: _____ mg to gange dagligt/mg tvisvar á dag

Lægens navn/Nafn læknis: _____

_____

Lægens telefonnummer/Símanúmer læknis: _____

(IS) **Upplýsingar fyrir sjúklinga / umönnunaraðila**

- Taktu / gefðu Apixaban Krka reglulega eins og mælt er fyrir um. Ef þú gleymir morgunskammti skaltu taka / gefa hann um leið og þú manst eftir því og hann má taka / gefa um leið og kvöldskammtinn. Kvöldskammt sem gleymst hefur að taka / gefa má aðeins taka / gefa sama kvöld. Ekki á að taka / gefa tvo skammta næsta morgun, heldur halda áfram að taka / gefa lyfið eins og venjulega tvisvar á dag eins og ráðlagt er næsta dag.
- Ekki hætta að taka / gefa Apixaban Krka án þess að ræða fyrst við lækninn, þar sem þú gætir / sjúklingurinn gæti átt í hættu að fá heilaslag (fullorðnir) / blóðtappa (börn) eða aðra kvilla.
- Apixaban Krka hjálpar við að þynna blóðið. Það getur þó aukið hættuna á blæðingu.
- Einkenni blæðinga eru meðal annars marblettir eða blæðing undir húð, tjörulitaðar hægðir, blóð í þvagi, blóðnasir, sundl, þreyta, fölvi og máttleysi, skyndilegur alvarlegur höfuðverkur, blóðhósti eða blóðuppköst.
- Ef blæðingin stöðvast ekki af sjálfu sér **skaltu leita læknis tafarlaust.**
- Ef þú þarft / sjúklingurinn þarf að gangast undir skurðaðgerð eða aðra aðgerð skaltu láta lækninn vita að þú takir Apixaban Krka / upplýsa heilbrigðisstarfsmanninn um að barnið taki Apixaban Krka.

04/2025

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn

- Apixaban Krka (apixaban) er segavarnarlyf til inntöku sem verkar með beinni, sértækri hömlun storkuþáttar Xa.
- Apixaban Krka getur aukið hættuna á blæðingu. Ef meiriháttar blæðing verður skal hætta notkun þess tafarlaust.
- Meðferð með Apixaban Krka þarfnast ekki reglulegs eftirlits með útsetningu. Kvörðuð magngreining á virkni gegn storkuþætti Xa getur verið gagnleg í undantekningartilvikum, t.d. við ofskömmtun og við bráðaskurðaðgerðir (ekki er mælt með storkuprófum eins og prótrombíntíma (PT), INR (International Normalized Ratio) og aPTT (activated partial thromboplastin time) – sjá samantekt á eiginleikum lyfs.
- Efni sem snýr við virkni apixabans gegn storkuþætti Xa er fáanlegt handa fullorðnum, hins vegar hefur öryggi þess og verkun ekki verið staðfest hjá börnum (sjá samantekt á eiginleikum lyfs fyrir andexanet alfa).

Šifra/Article No.: 633641