

Duodopa[®]

(foslevodopa/foscarbidopa)

til fremskreden Parkinsons sygdom

Denne patientvejledning indeholder vigtig sikkerhedsinformation som du skal være klar over.

Denne vejledning skal være tilgængelig, når du forbereder dig på at bruge dette lægemiddel.

[Type here]

abbvie

Hvorfor skal jeg læse denne patientvejledning?

DUODOPA[®] er et lægemiddel som anvendes til behandling af symptomerne på fremskreden Parkinsons sygdom.

Det anvendes, når andre tilgængelige kombinationer af lægemidler mod Parkinsons sygdom, ikke har givet tilfredsstillende resultater.

Dette lægemiddel gives under huden gennem et lille plastikrør (kanylen) i området omkring navlen. Dette område er infusionsstedet.

Det administreres som en uafbrudt infusion lige under huden, 24 timer i døgnet.

Nogle mennesker, som anvender dette lægemiddel, kan have problemer omkring huden, hvor kanylen går ind i kroppen.

Dette kan være:

- **en hudinfektion.** Dette er, når bakterier kommer ind i huden.

En hudinfektion kan blive alvorlig, når bakterier kommer over i blodet og spredes i kroppen. Dette kaldes sepsis.

- **en hudreaktion.** Dette er, når huden bliver irriteret/betændt.

Denne patientvejledning hjælper dig og din omsorgsperson med viden om:



Hvordan dit infusionssted vælges



Hvordan en infektion på infusionsstedet eller reaktion på infusionsstedet opdages



Hvordan du kan hjælpe til med at reducere muligheden for en infektion på infusionsstedet eller reaktion på infusionsstedet



Hvad du bør gøre, hvis du får en infektion på infusionsstedet eller reaktion på infusionsstedet



Hvor du kan finde mere information om dit lægemiddel



Hvordan du vælger dit infusionssted

Det er vigtigt at skifte dit infusionssted regelmæssigt. Dette hjælper din hud med at forblive sund og at medicinen afgives korrekt.

Du kan bruge din mave som infusionssted, medmindre lægen siger, du skal bruge et andet sted. Sørg for at det område, du vælger, er mindst 5 cm væk (omkring længden af din lillefinger) fra din navle.


- Undgå bæltelinjen da dette område kan være irriteret af trykket fra bæltet mod huden
- Undgå hud der er arret, hård eller har strækmærker
- Undgå hudfolder eller folder på din hud hvor den naturligt bøjer meget
- Brug et nyt infusionssæt (kanylerør), hver gang du skifter infusionssted.

Skift dit infusionssted hver 3. dag eller oftere afhængigt af ændringer i din hud (som rødme, hævelse eller smerte).

Dit nye infusionssted skal være mindst 2,5 cm væk (omkring to fingre) fra det sidste infusionssted, du anvendte.

Når du har brugt et infusionssted, må du ikke bruge det igen i 12 dage. Dette vil hjælpe din hud til at hele fuldstændigt.

Der er forskellige måder at hjælpe dig med at huske på, ikke at genbruge et infusionssted for tidligt. En måde er at lade som om, din mave er et ur. Du kan sætte din kanyle i med et forskelligt to "timers" interval hver gang. Du kan starte med klokken 12 så klokken 2, efterfulgt af klokken 4 og så videre.




Notér dato og sted for dine infusionssteder for at holde styr på det.



Hvordan genkendes en infektion eller reaktion på infusionsstedet

Se efter hudforandringer det sted hvor kanylen går ind i din hud. Ændringer i huden kan ske med eller uden feber og inkludere:

- rødme
- varm at røre ved
- hævelse
- ømhed/smerte
- ændringer i farven af huden når du trykker på huden





Hvad du kan gøre for at reducere muligheden for en infektion eller reaktion på infusionsstedet

Infektioner eller reaktioner på infusionsstedet kan opstå. Nedenfor er elementer, der skal tages i betragtning ved håndtering af infusionen.



Brug et godt oplyst område der er rent og fladt (som et bord) til at forberede infusionen.



Hold infusionsstedet og infusionssettet rent og sterilt når du forbereder infusionen.



Vask altid hænderne med vand og sæbe og tør dem med en papirserviet. Rør ikke ved noget urent efter.



Undgå at lade spidsen af sprøjten, hætteglasadapter, slangen eller stedkonnektoren røre en uren overflade.



Bortskaf forsigtigt anvendt materiale som er forurenet.



Når du har valgt et infusionssted, skal du tørre din hud af med en spritserviet. Sørg for at tørre i én retning, så du ikke forurener det rengjorte område. Lad det tørre i mindst 1 minut

Skift infusionssted hver 3. dag eller oftere afhængig af ændringerne i din hud (som rødme, hævelse, og smerte)



Når du bruger et nyt infusionssted, skal du ikke vælge det samme infusionssted i 12 dage. Dette vil hjælpe din hud med at hele fuldstændigt.



Hold altid 2,5 cm afstand (ca. 2 fingre) fra det sidste infusionssted, du brugte.



Anvend altid en ny kanyle og slange når du skifter til nyt infusionssted.



Bær behageligt tøj der ikke vil irritere huden på infusionsstedet.



Klip eventuelt hår omkring dit infusionssted med en saks. Dette vil hjælpe kanyletapen til at klæbe til din hud. Hvis du skal barbere din hud, skal du vente en dag, før du bruger dette infusionssted.



Hvad du skal gøre hvis du har en infektion eller reaktion på infusionsstedet

Skift infusionssted – vent ikke 3 dage. Kontakt din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet hvis du har følgende symptomer:

- rødme
- varm at røre ved
- hævelse
- ømhed/smerte
- ændringer i farven af huden når du trykker på huden

Genanvend ikke et infektionssted i mindst 12 dage eller indtil det er helet.



Hvor du kan finde mere information om dit lægemiddel

For yderligere information om dit lægemiddel kan du kigge i indlægssedlen og brugsvejledningen som fulgte med din medicin (foslevodopa/foscarbidopa).

For at indberette bivirkninger ved brugen af dit lægemiddel kan du kontakte din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Du kan også kontakte AbbVie A/S på tlf. + 45 72 30 20 28 for at indberette bivirkninger fra dit lægemiddel.