

VIGTIGE KONTAKTOPPLYSNINGER

Min læges navn:

Lægens telefonnummer:

Anden kontakt til hospitalet:

Andre kontakter:

Akut telefonnummer:

PATIENTDETALJER

Navn:

Telefonnummer:

Omsorgsperson/akut kontakt, navn og telefonnummer:

Vigtig information til patienter og omsorgspersoner

- Tremelimumab kan forårsage bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp for at forhindre dem i at blive værre
- Kontakt dine sundhedsfaglige personer hvis du er usikker på symptomerne
- Bivirkninger kan opstå uger og måneder efter behandlingens ophør
- Se indlægssedlen for mere information
- Patienter skal vise dette kort til alle læger som konsulteres

Vigtig information til sundhedsfagligt personale

- Denne patient behandles med tremelimumab, som er forbundet med immunmedierede bivirkninger.
- Tidlig diagnose og passende håndtering er afgørende for at minimere potentielle livstruende komplikationer
- Konsultation med en onkolog eller patientens sundhedsfaglige personer kan være nyttig til håndtering af immunmedierede bivirkninger.



IMJUDO (Tremelimumab) patientkort

Dette kort er kun beregnet til patienter, der får ordineret tremelimumab, og deres omsorgspersoner. Patienter bør altid have dette kort med sig

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning



Godkendt af
Lægemiddelstyrelsen:
Marts 2023
Version 1

Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om en bivirkning, selvom den ikke er angivet på dette kort eller i indlægssedlen

- Hvis du oplever bivirkninger, skal du kontakte dine sundhedsfaglige personer eller straks søge lægehjælp
- Behandl IKKE nogen symptomer selv, før du har talt med din læge
- Vær IKKE bekymret for, at du generer din læge

Symptomer, der kan virke milde, kan hurtigt forværres, hvis de ikke behandles.

Mulige symptomer

ØJNE

- Sløret syn
- Dobbelt syn
- Gulfarvning af det hvide i øjnene

BRYST

- Brystsmerter
- Uregelmæssig eller hurtig hjerterytme
- Vejrtrækningsbesvær
- Ny eller forværret hoste

MAVE OG TARME

- Vedvarende smerter i maven
- Svær kvalme eller opkastning
- Diarré
- Svær forstoppelse

MUSKLER OG LED

- Vedvarende eller svære muskelsmerter eller -svaghed
- Stivhed i nakken
- Prikken eller følelsesløshed i arme eller ben

HUD

- Gulfarvning af huden
- Udslæt og/eller kløe
- Øget svedtendens

GENEREL

- Feber
- Svær hovedpine
- Forvirring
- Svimmelhed
- Ekstrem træthed
- Uforklarligt vægttab
- Hævede ankler
- Blod i urinen