TYRUKO – Patientinformationskort

Patientens navn: _____

Lægens navn: _____

Lægens tlf.: _____

Startdato for behandling med TYRUKO: _____

Dette informationskort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på, inden du påbegynder behandlingen med TYRUKO, under behandlingen med TYRUKO og efter behandlingen med TYRUKO er stoppet.

- Vis dette kort til enhver læge, der er involveret i din behandling, ikke kun til din neurolog.
- Læs indlægssedlen for TYRUKO omhyggeligt, før du starter behandlingen.
- Du bør have dette kort på dig under behandlingen med TYRUKO og i 6 måneder efter, du har fået den sidste dosis af TYRUKO, da der kan forekomme bivirkninger, selv efter behandlingen med TYRUKO er stoppet.
- Vis dette kort til din partner, dine pårørende eller dine omsorgsgivere, som kan bemærke evt. symptomer på PML, du ikke selv bemærker. Det kan være f.eks. ændringer i humør eller opførsel, hukommelsessvigt og besvær med at tale eller kommunikere. Du skal være opmærksom på, at symptomerne kan opstå i op til 6 måneder efter behandlingen med TYRUKO er stoppet.

Inden behandling med TYRUKO

- Du bør ikke få behandling med TYRUKO, hvis du har et alvorligt problem med immun-systemet.
- Du bør ikke tage andre lægemidler til langtidsbehandling af multipel sklerose, mens du får TYRUKO.

Under behandling med TYRUKO

Progressiv Multifokal Leukoencefalopati (PML)

PML, der er en sjælden hjerneinfektion, kan forekomme hos patienter, der har fået TYRUKO. PML kan medføre svære funktionstab (invaliditet) eller død.

Risikoen for PML synes at stige med behandlingsvarigheden, særligt efter 2 år.

Symptomerne på PML kan ligne symptomer på et MS-attak. Derfor er det vigtigt, at du taler med din læge så hurtigt som muligt, hvis du tror, at din MS bliver værre, eller hvis du bemærker nye symptomer, mens du er i behandling med TYRUKO og op til 6 måneder efter endt behandling. Symptomerne på PML udvikler sig generelt langsommere end et MS-attak (over dage eller uger) og kan ligne dine MS-symptomer.

Symptomerne kan være:

- ændringer i mental kapacitet eller koncentration
- ændret opførsel
- svaghed i den ene side af kroppen
- synsproblemer
- nye neurologiske symptomer, du ikke har bemærket tidligere

Behandling af en evt. PML indebærer, at behandlingen med TYRUKO skal stoppes omgående.

Alvorlige infektioner

Der kan forekomme andre alvorlige infektioner i forbindelse med TYRUKO. Du skal derfor hurtigst muligt henvende dig til din læge eller sygeplejerske, hvis du tror, du har udviklet en alvorlig vedvarende infektion, for eksempel vedvarende feber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

SANDOZ

TYRUKO®
natalizumab

Sandoz A/S
www.sandoz.dk
mi.denmark@sandoz.com

NR2501070475, 1/2025

Godkendt af Lægemiddelstyrelsen 12-2024