

Behandlingscenter:	Vifor France	Patientkort - Filspari® Vigtig sikkerhedsadvarsel for patienter, som tager Filspari Dette kort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på, når du modtager behandling med Filspari. Hav altid dette kort på dig, og vis det til alle læger, som behandler dig. Hvis du bliver gravid eller tror, at du måske er gravid, mens du tager Filspari, eller kort efter, at du er holdt op med at tage Filspari (op til 1 måned), eller oplever tegn på, at din lever måske ikke fungerer korrekt, skal du tale med din læge med det samme.
Navn på den ordinerende læge:		
Telefonnummer på den ordinerende læge:		
Læs indlægsseddelen grundigt for flere oplysninger om Filspari. Spørg din læge, hvis du har nogen spørgsmål til din behandling.		

Graviditet Du må ikke tage Filspari hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Filspari kan skade det ufødte barn. Prævention Hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid, bør du bruge en sikker form for prævention, mens du tager Filspari og i 1 måned efter behandlingens ophør. Tal med din læge om dette. Graviditetstest Hvis du er en kvinde, som kan blive gravid, vil din læge bede dig om at tage en graviditetstest, inden du begynder at tage Filspari.	Overvågning af leverfunktion Din læge vil tjekke, før behandlingen starter og med jævne mellemrum under behandlingen, om din lever fungerer korrekt, og stoppe Filspari, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt, at du får foretaget de undersøgelser, som din læge ordinerer. Tegn på, at din lever muligvis ikke fungerer korrekt: kvalme (trang til at kaste op), opkastning, feber (høj temperatur), mavesmerter, gulsot (gulhed i huden eller det hvide i dine øjne), mørkfarvet urin, hudkløe, sløvhed eller træthed (usædvanlig træthed eller udmattelse), influenzalignende syndrom (muskel- og ledsmerter med feber). Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du bemærker nogle af disse symptomer.
---	---