

PATIENTKORT

Apixaban Orion (apixaban)

Jeg er i blodfortyndende behandling med Apixaban Orion (apixaban) for at forebygge blodpropper.

DU SKAL UDFYLDE DISSE FELTER ELLER BEDE LÆGEN OM AT GØRE DET

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikation: _____

Vægt: _____

Dosis: _____ mg to gange dagligt

Lægens navn: _____

Lægens telefonnummer: _____

OPLYSNINGER TIL PATIENTEN/OMSORGPERSOENER

- Husk at tage/give Apixaban Orion regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en morgendosis, skal du tage/give den så snart du kommer i tanke om det og eventuelt tage/give den sammen med din aftendosis. Hvis du har glemt en aftendosis, må du kun tage/give den samme aften. Du må ikke tage/give to doser næste morgen, men skal i stedet fortsætte behandlingen som normalt næste dag med en dosis to gange dagligt som anbefalet.
- Stop ikke med at tage/give Apixaban Orion uden først at tale med lægen, da du/patienten har risiko for at få et slagtilfælde/en blodprop eller få andre komplikationer.
- Apixaban Orion hjælper med at fortynde dit blod. Dette kan imidlertid øge risikoen for blødninger.
- Tegn og symptomer på blødning omfatter blå mærker eller blødning under huden, tårerfarvet afføring, blod i urinen, næseblod, svimmelhed, træthed, bleghed eller svaghedsfølelse, pludselig kraftig hovedpine, ophostning eller opkastning af blod.
- Hvis blødningen ikke holder op af sig selv, **skal du straks søge lægehjælp**.
- Hvis du/patienten skal opereres eller have foretaget andre indgreb, skal du fortælle lægen, at du/patienten tager Apixaban Orion.

Du, barnet eller omsorgspersonen skal altid have dette kort på dig/sig.

Vis kortet til apotekspersonalet, tandlægen eller til andre sundhedspersoner inden behandling.

OPLYSNINGER TIL SUNDHEDSPERSONALET

- Apixaban Orion (apixaban) er et oralt antikoagulant, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.
- Apixaban Orion kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af større blødninger, skal det straks seponeres.
- Behandling med Apixaban Orion kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) koagulationstest frarådes) – se produktresuméet.
- Et middel til at reversere anti-faktor Xa-aktiviteten af apixaban er tilgængeligt til voksne. Dette stofs sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt hos pædiatriske patienter (se produktresuméet for andexanet alfa).