

ELREXFIO[®]-patientkort



Opbevar altid dette kort på dig og vis det til enhver læge, sygeplejerske eller tandlæge, som er involveret i din behandling, hvis du kommer på skadestue eller lignende.

Vigtig sikkerhedsinformation til patienter, der bliver behandlet med ELREXFIO

Til patienten

Du skal omgående kontakte din læge eller sygeplejerske, hvis du oplever nogle af disse symptomer:

- Feber (38°C eller højere)
- Vejrtrækningsbesvær
- Kulderystelser
- Hovedpine
- Lavt blodtryk
- Svimmelhed
- Hurtig hjerterytme
- Forhøjet antal leverenzzymer i blodet
- Forvirring
- Føler dig mindre opmærksom
- Svært ved at tale eller skrive
- Snurrende fornemmelse, følelsesløshed, smerte eller tab af følelse

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager andre lægemidler samtidig med ELREXFIO.

Dette er vigtigt at huske:

Du kan blive bedt om at opholde dig i nærheden af sygehuset i 48 timer efter hver af de første to optrapningsdoser, så lægen kan overvåge dig for bivirkninger.

- Hvis du har nogle af disse symptomer, ring til din læge eller søg akut lægehjælp med det samme! Disse er ikke alle de mulige symptomer, som du kan få af ELREXFIO. Fortæl det til din læge, hvis du har symptomer, der generer dig eller ikke forsvinder.



Trafik- og arbejdssikkerhed

- Nogle personer kan føle sig trætte, svimle eller forvirrede, når de får ELREXFIO. Du må ikke køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner før mindst 48 timer efter hver af de 2 optrapningsdoser, og indtil dine symptomer er aftaget, eller som anvist af sundhedspersonalet.

Til sundhedspersonalet

Vigtig sikkerhedsinformation:

- Behandling med ELREXFIO kan udløse cytokinreleasesyndrom (CRS) eller neurologisk toksicitet herunder immuneffektorcelleassocieret neurotoksicitetssyndrom (ICANS), som kan være alvorlig eller livstruende. CRS kan omfatte flere organer.

Denne patient bliver behandlet med ELREXFIO

Lægens navn:

Telefonnummer
i dagtimerne:

Telefonnummer
uden for normal åbningstid:

Sygehus/afdeling:

Datoer for indsprøjtning af ELREXFIO:

Optrapningsdosis 1 _____

Optrapningsdosis 2 _____

Første fulde dosis _____



PP-L1A-DNK-0010; April 2024