

- ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får:  
[www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)
- 

## **HETRONIFLY (serplulimab) patientkort**

**VIGTIGT** – Dette kort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende din behandling med serplulimab. **Hav altid kortet på dig** under behandlingen med serplulimab og i mindst 3 måneder efter, at du har afsluttet behandlingen. Vis altid kortet til det sundhedspersonale, som varetager din behandling.

Vigtige sikkerhedsoplysninger for at minimere risikoen for immunmedierede bivirkninger.

- Kontakt specialisten eller om nødvendigt anden akut lægehjælp med det samme, hvis du får nogen af de tegn

eller symptomer, som er beskrevet på dette kort.

- Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Accord Healthcare AB, 169 70 Solna, Tel: +46 8 624 0025, Mail: [denmark@accord-healthcare.com](mailto:denmark@accord-healthcare.com)

***Kontakt specialisten med det samme, hvis du får nogen tegn eller symptomer, som kan omfatte nedenstående:***

### **Lunger**

- Vejrtrækningsproblemer
- Hoste

### **Lever**

- Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)
- Alvorlig kvalme eller opkastning
- Smerter i højre side af maven
- Døsighed
- Mørk urin (farve som te)
- Blødning eller lettere ved at få blå mærker end normalt
- Mindre sulten end normalt
- Træthed
- Unormale leverfunktionstest

### **Hjerte**

- Vejrtrækningsproblemer
- Svimmelhed eller besvimelse
- Feber
- Brystsmerter og trykken for brystet

- Influenzalignende symptomer

## **Hormonkirtler**

- Ekstrem træthed
- Hurtig hjerterytme
- Øget svedtendens
- Ændringer i humør eller adfærd, f.eks. irritabilitet eller glemsomhed
- Fryser
- Meget lavt blodtryk (besvimelse, svimmelhed, træthed, kvalme)
- Vægtændring
- Hovedpine

## **Diabetes/diabetisk ketoacidose**

- Mere sulten eller tørstig end normalt
- Hyppigere vandladning
- Vægttab
- Træthed
- Problemer med at tænke klart
- Ånde lugter sødlig eller frugtagtig
- Kvalme eller opkastning
- Mavesmerter
- Dyb eller hurtig vejrtrækning

## **Tarme og mave**

- Diarré (tynd mave)
- Mere afføring end normalt

- Blod i afføringen eller mørk, tjæreagtig, klistret afføring
- Kraftige mavesmerter eller ømhed

## **Nyrer**

- Unormale nyrefunktionstest
- Mindre vandladning end normalt
- Blod i urinen
- Hævede ankler

## **Øjne**

- Smerter i øjnene
- Røde øjne
- Lysfølsomhed
- Sløret syn
- Små "fluer", der bevæger sig i synsfeltet
- Tab af perifert syn (evnen til at se genstande i siden af synsfeltet)

## **Bugspytkirtel**

- Mavesmerter
- Kvalme
- Opkastning

## **Muskler**

- Muskelsmerter
- Svaghed

## **Hud**

- Udslæt eller kløe
- Blærer i huden
- Sår i munden eller andre slimhinder

## **Nervesystemet**

- Hovedpine eller nakkestivhed
- Feber
- Træthed eller svaghed
- Kulderystelser
- Opkastning
- Forvirring
- Hukommelsesproblemer eller søvnighed
- Krampeanfald
- Ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer)

## **Infusionsrelaterede reaktioner**

- Åndenød eller hvæsende vejrtrækning
- Kulderystelser eller rysten
- Hudslæt/nældefeber med hævelser
- Rødmen
- Lavt blodtryk (svimmelhed, træthed, kvalme)
- Feber
- Rygsmerter
- Mavesmerter

---

## VIGTIGT

- Du må ikke forsøge at diagnosticere eller behandle bivirkninger selv.
- Hav altid patientkortet på dig, især når du er på rejse, når du tager på skadestuen, eller når du konsulterer en anden læge, sygeplejerske eller apotekspersonale.
- Husk at fortælle alle typer sundhedspersonale, du møder, at du er i behandling med serplulimab, og vis dem dette kort.

Der henvises til produktresuméet og indlægssedlen til serplulimab, som kan findes på [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu), eller du kan kontakte Accord Healthcare AB, 169 70 Solna, Tel: +46 8 624 0025  
Mail: [denmark@accord-healthcare.com](mailto:denmark@accord-healthcare.com)  
for yderligere information.

## VIGTIG INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONALE

Denne patient er i behandling med Hetronifly (serplulimab), som kan give infusionsrelaterede reaktioner samt immunmedierede bivirkninger, som kan påvirke lunger, lever, hjerte, tarme, hormonkirtler, nyrer, bugspytkirtel og andre organer. Tidlig diagnose og passende behandling er afgørende for at minimere eventuelle følger af immunmedierede bivirkninger.

Ved mistanke om immunmedierede bivirkninger bør der udføres passende evaluering for at bekræfte ætiologi eller udelukke andre årsager. Specifikke retningslinjer for behandling af immunmedierede bivirkninger og infusionsrelaterede reaktioner kan findes i produktresuméet til serplulimab, som kan ses på [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu), eller ved at kontakte Accord Healthcare AB, 169 70 Solna, Tel: +46 8 624 0025, Mail: [denmark@accord-healthcare.com](mailto:denmark@accord-healthcare.com) for yderligere oplysninger.

*Patienterne skal vurderes for tegn og symptomer på pneumonitis, hepatitis, myokarditis, colitis, endokrinopati (herunder hypothyroidisme, hyperthyroidisme, thyroiditis, binyrelidelser, hypofyseforstyrrelser, diabetes mellitus/hyperglykæmi), pancreatitis, nefritis og*

Version 2.0

Vurderet af Lægemiddelstyrelsen: 2026-03-03

*nyreinsufficiens, uveitis og andre immunmedierede bivirkninger, som er rapporteret hos patienter, inklusive myasthenia gravis og myasthenisk syndrom, der har fået serplulimab.*

# VIGTIGE KONTAKTOPLYSNINGER

Navn på specialist

---

Telefon

---

Telefon uden for kontortid

---

Mit navn

---

Mit telefonnummer

---

Kontakt ved akut behov (navn)

---

Kontakt ved akut behov (telefon)

---

Version 2.0

Vurderet af Lægemiddelstyrelsen: 2026-03-03