

Vigtige oplysninger til sundhedspersoner

Denne patient er i behandling med retifanlimab, som kan forårsage immunmedierede bivirkninger, der kan forekomme når som helst under behandlingen eller endda efter behandlingen. Vurder patienten for tegn og symptomer på immunmedierede bivirkninger. Tidlig diagnosticering og passende håndtering er afgørende for at minimere eventuelle konsekvenser af immunmedierede bivirkninger.

Der er specifikke retningslinjer for håndtering af immunmedierede bivirkninger i produktresuméet for retifanlimab.

Konsultation med en onkolog eller en anden speciallæge kan være nyttig til håndtering af organspecifikke immunmedierede bivirkninger.

© 2026 Incyte Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningsmateriale godkendt af Lægemiddelstyrelsen 27/02/2026 som beskrevet i den af Lægemiddelstyrelsen godkendte Risikostyringsplan. DK/ZYN/NP/26/0001

Du kan få yderligere oplysninger i indlægssedlen for retifanlimab, som indeholder patientinformation, eller på følgende hjemmeside:
www.incyteglobalmedicalinformation.com
eller ved at ringe til Incyte Medical Information på +800 00027423 (gratisnummer) eller kontakte eumedinfor@incyte.com.

VIGTIGT

- Du må ikke forsøge at behandle bivirkninger selv.
- Du må ikke stoppe din behandling med retifanlimab, medmindre du har drøftet dette med din læge.
- Hav altid dette kort på dig, især når du er på rejse, hver gang du tager på skadestuen, eller når du har behov for at konsultere en anden læge.
- Hav dette kort på dig i mindst 4 måneder efter den sidste dosis retifanlimab.
- Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget på dette kort.

Patientkort

▼ZYNZY® (retifanlimab)

Vigtige sikkerhedsoplysninger til minimering af risikoen for immunmedierede bivirkninger

Retifanlimab kan forårsage alvorlige bivirkninger, som i visse tilfælde kan blive livstruende og føre til dødsfald. Disse bivirkninger kan forekomme når som helst under behandlingen eller endda efter, at din behandling er afsluttet. Du kan få mere end én bivirkning ad gangen.

Kontakt din speciallæge med det samme, hvis du udvikler tegn eller symptomer, herunder dem, der ikke er anført på dette kort. Din læge vil eventuelt give dig andre lægemidler for at forebygge mere alvorlige komplikationer og mindske dine symptomer. Din læge vil eventuelt ikke give dig den næste dosis retifanlimab eller vil stoppe behandlingen.

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får via: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

**Kontakt lægen med det samme,
hvis du får et af følgende symptomer:**

Lunger

- Vejtrækningsbesvær
- Ny eller forværret hoste
- Brystsmerter

Tarmsystem

- Hyppig diarré, ofte med blod og/eller slim
- Øget afføringshyppighed
- Blodig, sort eller tjærelignende afføring
- Kraftige mavesmerter eller ømhed i maveregionen
- Kvalme eller opkastning

Lever

- Appetitløshed
- Vedvarende kvalme eller opkastning
- Smerte i højre side af maven
- Gulfarvning af det hvide i øjnene og/eller huden
- Døsighed
- Mørkfarvet urin
- Øget tendens til blødning og blå mærker

Nyrer

- Nedsat vandladningsmængde
- Skummende urin
- Blod eller spor af blod i urinen, som kan ændre urinens farve
- Hævede ankler
- Appetitløshed

Hormonkirtler

- Hurtig hjerterytme
- Svimmelhed eller besvimelse
- Ekstrem træthed
- Vedvarende eller usædvanlig hovedpine
- Vægtforandringer
- Kuldefornemmelse
- Hårtab
- Forstoppelse

Type 1-diabetes eller diabetisk ketoacidose

- Større sult- eller tørstfornemmelse end normalt
- Hyppig vandladning
- Vægttab
- Træthed eller kvalme
- Problemer med at tænke klart
- Hurtig og dyb vejtrækning
- Ånde, der lugter sødt eller frugtagtigt
- En sød eller metallisk smag i munden
- Mavesmerter
- Søvnighed
- Urin eller sved, der lugter anderledes

Hud

- Udslet eller kløe
- Blærer på huden eller sår i munden eller på slimhinden i næsen, i svælget eller omkring kønsdelene

Andre organer

- Synsforandringer
- Betændelse i led, muskler, nerver, bugspytkirtlen eller hjertemusklen

Vigtige kontaktoplysninger

Speciallægens navn

Telefonnummer i åbningstid

Telefonnummer uden for normal arbejdstid

Mit navn

Mit telefonnummer

Kontakt i nødsituationer (navn)

Kontakt i nødsituationer (telefonnummer)