

▼ Dette påmindelseskort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal vide før og under behandling med denosumab-injektioner (Wyost) for kræftrelaterede lidelser.

Lægen har anbefalet, at du får injektioner med denosumab (Wyost), som bruges til at forhindre knoglekomplikationer (såsom frakturer), der kan være forårsaget af knoglemetastaser eller knoglekræft.

En bivirkning kaldet osteonekrose i kæben (ONJ, knogleskader i kæben) er blevet rapporteret hos nogle patienter, der får denosumab-injektioner for osteoporose (kan ramme op til 1 ud af 10 personer). ONJ kan også forekomme efter endt behandling.

Det er vigtigt at undgå at få ONJ. Dette kan være en smertefuld tilstand, som kan være svær at behandle. For at nedsætte risikoen for at udvikle ONJ bør du tage nogle forholdsregler.

Inden behandlingen påbegyndes:

- Spørg din læge, om et tandeftersyn anbefales, før du starter behandling med denosumab.
- Fortæl din læge/sygeplejerske (sundhedspersonale), hvis du har mund- eller tandproblemer.

Patienter, der gennemgår en tandoperation (f.eks. tandudtrækning), ikke kommer til regelmæssige tandlægebesøg, har tandkødssygdomme, ryger eller gennemgår forskellige typer kræftbehandlinger, kan have højere risiko for at udvikle ONJ.

Under behandlingen:

- Du bør opretholde en god mundhygiejne og få rutinemæssige tandeftersyn. Hvis du bruger tandproteser, skal du sørge for, at de sidder ordentligt.
- Hvis du er under tandbehandling eller skal til en tandoperation (f.eks. tandudtrækning), skal du informere din læge og fortælle tandlægen, at du er i behandling med denosumab.
- Kontakt straks din læge og tandlæge med det samme, hvis du oplever problemer med din mund eller tænder, såsom løse tænder, smerter eller hævelse, eller sår, der ikke heler eller siver pus (væske), da disse kan være tegn på ONJ.

Læs indlægssedlen, der følger med lægemidlet, for yderligere information.