

Stoboclo® (denosumab) patient-påmindelseskort

Dette patient-påmindelseskort indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som du skal være opmærksom på før og under behandling med denosumab (Stoboclo®).

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.

Lægen har anbefalet, at du får denosumab (Stoboclo), som bruges til at behandle osteoporose (knogleskørhed) og knogletab. Disse sygdomme kan medføre, at knoglerne bliver tynde og skrøbelige, og risikoen for brud stiger.

En sjælden bivirkning kaldet osteonekrose i kæben (ONJ) (beskadigelse af knoglen i kæben) er blevet rapporteret hos meget få patienter, der fik denosumab på grund af osteoporose (det kan ske for 1 ud af 1 000 personer). ONJ kan også opstå efter at behandlingen er afsluttet.

Det er vigtigt at forsøge at undgå at der opstår ONJ, da det kan være en smertefuld tilstand, som kan være svær at behandle. For at mindske risikoen for at du får ONJ bør du tage nogle forholdsregler.

Inden behandlingen påbegyndes:

Fortæl det til din læge/sygeplejerske (sundhedspersonalet), hvis du har problemer med din mund eller dine tænder.

Din læge kan bede dig om at få en tandundersøgelse, hvis du:

- tidligere er blevet behandlet med et andet lægemiddel, som er et bisfosfonat
- får lægemidler, der kaldes for kortikosteroider (f.eks. prednisolon eller dexamethason)
- er ryger
- har kræft
- ikke jævnligt går til tandlæge eller ikke har fået tjekket dine tænder i lang tid
- har problemer med din mund eller dine tænder

Under behandlingen:

- Du skal sørge for at have en god mundhygiejne og gå jævnligt til tandlægen. Hvis du bruger tandprotese, skal du sikre dig, at den passer korrekt.
- Hvis du er under tandbehandling eller skal have en tandoperation (f.eks. tandudtrækning), skal du informere din læge og fortælle tandlægen, at du er i behandling med denosumab (Stoboclo).
- Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du får problemer med din mund eller dine tænder, såsom løse tænder, smerter eller hævelse, manglende opheling af sår eller sekretion, da det kan være tegn på ONJ.

Læs indlægssedlen, der følger med lægemidlet, for yderligere information.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
www.meldenbivirkning.dk

eller til Celltrion Healthcare E-mail: contact_dk@celltrionhc.com

Ved at indrapportere bivirkninger, kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af Stoboclo®.