

Dette patientkort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal være opmærksom på før og under behandling med denosumab-injektioner (▼ Osvyrti).

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.

Din læge har anbefalet, at du får denosumab (Osvyrti), som bruges til behandling af knogleskørhed (osteoporose) og knogletab. Disse sygdomme involverer udtynding og svækkelse af knoglerne, så de kan brække lettere.

Patienter, der får denosumab på grund af knogleskørhed, kan i sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) få en bivirkning, der kaldes for osteonekrose i kæben (beskadigelse af knoglen i kæben). Osteonekrose i kæben kan også opstå, efter at behandlingen er afsluttet.

Det er vigtigt at forsøge at undgå, at der opstår osteonekrose i kæben, da det kan være en smertefuld tilstand, som kan være svær at behandle. Der er nogle forsigtighedsregler, du skal følge for at mindske risikoen for, at du får osteonekrose i kæben.

Før behandlingsstart:

Fortæl det til din læge/sygeplejerske (sundhedspersoner), hvis du har problemer med din mund eller dine tænder.

Din læge vil muligvis bede dig om at blive undersøgt hos tandlægen, hvis du:

- tidligere er blevet behandlet med bisfosfonater
- får lægemidler, der kaldes for kortikosteroider (f.eks. prednisolon eller dexamethason)
- er ryger
- har kræft
- ikke har været hos tandlægen i lang tid
- har problemer med din mund eller dine tænder

Under behandlingsforløb:

- Du bør opretholde en god mundhygiejne og regelmæssigt gå til tandlægen. Hvis du bruger tandproteser, skal du sørge for, at de passer ordentligt.
- Hvis du er under tandbehandling eller skal gennemgå en tandoperation (f.eks. tandudtrækning), skal du fortælle din læge og din tandlæge, at du er i behandling med denosumab.
- Kontakt straks din læge og tandlæge, hvis du får problemer med din mund eller dine tænder, f.eks. løse tænder, smerter eller hævelse, manglende opheling af sår eller sekretion, da det kan være tegn på osteonekrose i kæben.

Læs indlægssedlen, der følger med dit lægemiddel, for at få yderligere oplysninger.

Indberetning af bivirkninger

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om Osvyrtis sikkerhed.