

Rapportering af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af denosumab.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se nedenfor, hvordan bivirkninger indberettes.

Dette patientkort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Bomynta (denosumab) injektioner for kræftrelaterede tilstande.

Din læge har anbefalet, at du får denosumab injektioner for at forebygge knoglekomplikationer (f.eks. brud) forårsaget af knoglemetastaser eller knoglekræft.

En bivirkning kaldet osteonekrose i kæben (ONJ) (knogleskade i kæben) er blevet rapporteret ofte (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, der får denosumab in-

BS_0010/Januar 2026

jektioner mod kræftrelaterede tilstande. ONJ kan også forekomme efter behandlingsophør.

Det er vigtigt at forsøge at forhindre ONJ i at udvikle sig, da det kan være en smertefuld tilstand, der kan være vanskelig at behandle. For at reducere risikoen for at udvikle ONJ er der nogle forholdsregler, du bør tage:

Før du starter behandling:

Tjek med din læge, om en tandundersøgelse anbefales, før du starter behandling med denosumab.

- Fortæl din læge/sygeplejerske (sundhedsperson), hvis du har problemer med din mund eller dine tænder.

Patienter, der gennemgår tandkirurgi (f.eks. tandudtrækninger) eller som ikke får rutinemæssig tandpleje, har tandkødssygdomme, er rygere eller som får forskellige former for kræftbehandling, kan have en øget risiko for at udvikle ONJ.

Under behandlingen:

- Du bør opretholde en god mundhygiejne og få regelmæssige tandeftersyn. Hvis du bruger tandproteser, skal du sørge for, at de passer korrekt.
- Hvis du er i tandbehandling eller skal have foretaget tandkirurgi (f.eks. tandudtrækninger), skal du informere din læge og din tandlæge om, at du er i behandling med denosumab.
- Kontakt din læge og tandlæge med det samme, hvis du oplever problemer med din mund eller dine tænder, såsom løse tænder, smerter eller hævelse, manglende heling af sår eller sekretdannelse, da disse kan være tegn på ONJ.

Læs indlægssedlen, som følger med din medicin, for yderligere information.