

Patientkort Dette kort indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal være opmærksom på, når du er i behandling med Macitentan Viatris. Hav altid dette kort på dig, og vis det til enhver læge, der er involveret i din medicinske behandling. Macitentan Viatris macitentan Det er vigtigt, at du omgående fortæller det til din læge, hvis du bliver gravid eller får bivirkninger under behandlingen med Macitentan Viatris. Behandlingscenter: _____ Ordinerende læges navn: _____ Ordinerende læges telefonnummer: _____	DK Graviditet Macitentan Viatris kan skade fostrets udvikling. Derfor må du ikke tage Macitentan Viatris, hvis du er gravid, og du skal også undgå at blive gravid, så længe du tager Macitentan Viatris. Hvis du lider af pulmonal arteriel hypertension, kan graviditet desuden forværre symptomerne på din sygdom i alvorlig grad. Prævention Du skal anvende en sikker præventionsmetode (kontraception), så længe du tager Macitentan Viatris. Hvis du har nogen spørgsmål, så kontakt lægen. Du skal have taget en graviditetstest, inden du begynder at tage Macitentan Viatris, og hver måned under behandlingen, også selvom du ikke mener, at du er gravid. Ligesom andre lægemidler i denne klasse kan Macitentan Viatris forårsage virkninger på leveren. Lægen vil tage nogle blodprøver,	før du starter behandlingen med Macitentan Viatris og under behandlingen, for at kontrollere om din lever fungerer korrekt. Tegn på, at din lever ikke fungerer korrekt, omfatter: • Kvalme (opkastningstrang) • Opkastning • Feber (forhøjet kropstemperatur) • Mavesmerter • Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene) • Mørkfarvet urin • Kløe i huden • Letargi eller træthed (usædvanlig træthed eller udmattelse) • Influenzalignende symptomer (led- og muskelsmerter med feber) Kontakt omgående lægen, hvis du bemærker et eller flere af disse tegn. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om din behandling. DD-mmm-YYYY
---	--	---