

PATIENTKORT

Apixaban Glenmark (apixaban)

Patientkort

Du, barnet eller omsorgspersonen skal altid have dette kort på dig/sig

Vis kortet til apotekspersonalet, tandlægen eller til andre sundhedspersoner inden behandling

Jeg er i blodfortyndende behandling med Apixaban Glenmark (apixaban) for at forebygge blodpropper

Du skal udfylde disse felter eller bede lægen om at gøre det

Navn:

Fødselsdato:

Indikation:

Vægt:

Dosis:.....mg to gange dagligt

Lægens navn:

Lægens telefonnummer:

Oplysninger til patienter/omsorgspersoner

- Husk at tage/give Apixaban Glenmark regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en morgendosis, skal du tage/give den så snart du kommer i tanke om det og eventuelt tage/give den sammen med din aftendosis. Hvis du har glemt en aftendosis, må du kun tage/give den samme aften. Du må ikke tage/give to doser næste morgen, men skal i stedet forsætte behandlingen som normalt næste dag med en dosis to gange dagligt som anbefalet.
- Stop ikke med at tage/give Apixaban Glenmark uden først at tale med lægen, da du/patienten har risiko for at få et slagtilfælde/en blodprop eller få andre komplikationer.
- Apixaban Glenmark forebygger blodpropper ved at fortynde blodet. Dette kan imidlertid øge risikoen for blødninger.
- Tegn og symptomer på blødning omfatter blå mærker eller blødning under huden, tjærefarvet afføring, blod i urinen, næseblod, svimmelhed, træthed, bleghed eller svaghedsfølelse, pludselig kraftig hovedpine, ophostning eller opkastning af blod.
- Hvis blødningen ikke holder op af sig selv, **skal du straks søge lægehjælp.**
- Hvis du/patienten skal opereres eller have foretaget andre indgreb, skal du fortælle lægen, at du/patienten tager Apixaban Glenmark.

{MMM ÅÅÅÅ}

Oplysninger til sundhedspersoner

- Apixaban Glenmark (apixaban) er et oralt antiokoagulans, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.
- Apixaban Glenmark kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af større blødning, skal det straks seponeres.
- Behandling med Apixaban Glenmark kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) frarådes) – se produktresuméet. Et middel til at reversere anti-faktor Xa-aktiviteten af apixaban er tilgængeligt til voksne. Dette stofs sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt hos pædiatriske patienter (se produktresuméet for andexanet alfa).