PATIENTBROCHURE

EURneffy®
(nasal adrenalinspray)

Sådan identificeres en svær allergisk reaktion

Brug næsesprayen ved de første tegn på en svær allergisk reaktion (anafylaksi) efter eksponering for et allergen.
Symptomer kan omfatte:

- Hudkløe
- Hævet udslæt (såsom nældefeber)
- Rødmen
- Hævelse af læber, svælg, tunge, hænder og fødder
- Hvæsende vejrtrækning
- Hæshed
- Åndenød
- Kvalme
- Opkastning
- Mavekramper
- Tab af bevidsthed
- Angst
- Hurtig puls
- Krampeanfald
- Diarré
- Tab af kontrol med vandladningen

Symptomer kan være svære at genkende hos mindre børn. Se indlægssedlen for yderligere information. **Brug altid næsesprayen efter lægens eller sygeplejerskens anvisning.**

TØV IKKE, brug straks,
da sværhedsgraden af symptomerne kan ændre sig hurtigt.

Du skal sikre dig, at du, dit barn, din familie, dine omsorgspersoner, kolleger og lærere ved, hvordan og hvornår næsesprayen skal bruges.

Version 2.0 / 07.2026

EURneffy® fås i to styrker til patienter fra alderen 4 år.

1 mg til patienter, der vejer 15 kg til under 30 kg, og 2 mg til patienter, der vejer 30 kg eller mere.

Opbevaring *og* håndtering

Næsesprayen indeholder én enkelt dosis adrenalin og leveres i en blisterpakning med brugsanvisning.

Hav altid 2 næsespray på dig i tilfælde af, at der er behov for endnu en dosis.

Husk at kontrollere udløbsdatoen regelmæssigt, og anskaf en ny næsespray, før udløbsdatoen overskrides.

Vejledning i korrekt brug for patienter og omsorgspersoner

Denne vejledning er lavet for at vejlede dig i, hvad du skal gøre i tilfælde af en svær allergisk reaktion eller anafylaksi.
Både patienter og omsorgspersoner bør kende denne vejledning for at sikre, at de kan genkende symptomer på en allergisk reaktion og vide, hvordan de sikkert og effektivt skal bruge næsesprayen.

1. Hold

Hold næsesprayen som vist. Hold næsesprayen med tommelfingeren på stemplets bund og en finger på hver side af dysen.

UNDGÅ at trække i stemplet eller trykke det ind.
Test IKKE ved at spraye på forhånd.
Hver næsespray indeholder kun én dosis.



2. Placer

Før spidsen af næsesprayen ind i et næsebor, indtil fingrene rører næsen.
Hold den lige, rettet mod panden.

3. Tryk

Tryk stemplet op med et fast tryk, til det giver efter og sprøjter ind i næseboret.

Ret IKKE næsesprayen mod næsens inderste eller yderste væg.

Efter brug

Ring omgående 112 for tæt overvågning af den anafylaktiske reaktion og eventuel yderligere behandling. Hvis du ikke selv er i stand til det, så skal en anden ringe for dig.

Under brug

Patienten skal helst ligge fladt med fødderne højt, men skal sætte sig op, hvis der er vejrtrækningsbesvær. Bevidstløse patienter bør anbringes i aflåst sideleje for at undgå kvælning. Hvis symptomerne ikke forsvinder, bør du om muligt blive sammen med en anden person for nøje overvågning, indtil lægehjælpen kommer.

Overvåg patientens symptomer

Hvis symptomerne fortsat bliver værre eller gentager sig efter ca. 10 minutter, eller hvis der opstår en doseringsfejl, så brug en ny næsespray til at give endnu en dosis i SAMME næsebor som den første dosis.

Hvad er EURneffy®?

En nasal adrenalinspray til voksne og børn fra alderen 4 år med en legemsvægt på 15 kg eller mere til akut behandling af svære allergiske reaktioner, herunder anafylaksi (allergiske reaktioner, der er pludselige, alvorlige og til tider livstruende), over for insektstik eller -bid, fødevarer, lægemidler og andre allergener (allergiforårsagende stoffer) samt idiopatisk anafylaksi (anafylaksi af ukendt årsag) og motionsforårsaget anafylaksi.

Uddannelsesmateriale og indlægsseddel findes på www.eurneffy.eu eller ved at scanne QR-koden.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med lægen, apoteks-personalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted:
www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Lokal repræsentant:
ALK-Abelló Nordic A/S
Tlf: 38 16 70 70
E-mail: infodk@alk.net