

▼ **IMDYLLTRA® (tarlatamab)** ▲ **PATIENTKORT**

SKAL UDFYLDES AF DEN ORDINERENDE LÆGE

DENNE PATIENT HAR MODTAGET IMDYLLTRA

Patientnavn / telefonnummer

Dato og tidspunkt for første IMDYLLTRA-infusion

Ordinerende læge navn / telefonnummer

Navn på hospital / center / institution

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får, til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk/
E mail: dkma@dkma.dk

[Dette patientkort opfylder betingelserne for markedsføringstilladelsen og er godkendt af den kompetente myndighed.]

JUNI 2026 DK - Version 1.0

VIGTIG INFORMATION FOR SUNDHEDSPERSONALE

- Denne patient behandles med IMDYLLTRA som er et bispecifikt T-celle engagerende (BiTE)-molekyle.
- IMDYLLTRA anvendes til behandling af voksne patienter med småcellet lungekræft (SCLC).
- IMDYLLTRA kan forårsage bivirkninger, som kan være alvorlige og livstruende, såsom cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) og immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom (ICANS).

Vejledning til håndtering af CRS og ICANS kan læses i produktresuméet.

Hvis denne patient oplever nogen af symptomerne på dette kort, bedes du straks kontakte den ordinerende læge for yderligere information.

VIGTIG INFORMATION TIL PATIENTER/OMSORGSPERSONER

IMDYLLTRA kan forårsage alvorlige og/eller livstruende bivirkninger, såsom cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) og immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom (ICANS).

Ring til din ordinerende læge eller søg akut lægehjælp MED DET SAMME, hvis du oplever NOGEN af disse symptomer.

- Feber (38.0°C eller højere)
- Hypotension (lavt blodtryk)
- Vejrtrækningsbesvær
- Hurtig eller uregelmæssig hjerteslag
- Forvirring, talebesvær, hukommelsestab eller personlighedsforandringer
- Svimmelhed eller omtågethed
- Svær hovedpine
- Kulderystelser eller skælven
- Svær kvalme, opkastning eller diarré
- Krampeanfald
- Tab af balance, kraftsløshed, følelsesløshed
- Ekstrem søvnighed eller nedsat bevidsthed

Dette er ikke alle de mulige bivirkninger ved IMDYLLTRA. Se venligst indlægsseddel for en komplet liste over mulige bivirkninger. Du bør altid konsultere din ordinerende læge om at tage andet medicin, mens du tager IMDYLLTRA.

VIGTIG INFORMATION TIL PATIENTER/OMSORGSPERSONER

Du skal opholde dig i nærheden af en passende sundhedsfacilitet, såsom behandlingshospitalet, i 24 timer fra starten af hver IMDYLLTRA-infusion på dag 1 og dag 8, ledsaget af en omsorgsperson.

KONTAKT din ordinerende læge, hvis du oplever nogen af symptomerne, der er angivet på dette kort.

SØG akut hjælp, hvis du ikke kan få fat i din ordinerende læges klinik.

DU MÅ IKKE køre eller betjene maskiner, hvis neurologiske symptomer som svimmelhed, kramper og forvirring opstår, indtil symptomerne forsvinder.