



PATIENTVEJLEDNING

PLUVICTO[®] ▼

(lutetium (¹⁷⁷Lu) vipivotidtetraaxetan)

Denne vejledning er udarbejdet for at give oplysninger om PLUVICTO[®] til patienter, som har fået ordineret PLUVICTO[®], eller til deres omsorgspersoner.

- ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.



S AHLÉN MEDICAL NORDIC AB
Cylindervägen 18, PLAN 5
131 52 Nacka Strand, SWEDEN

info@samnordic.se
+46 8 720 58 22
www.samnordic.se



PLUVICTO[®]
lutetium (¹⁷⁷Lu) vipivotide tetraaxetan
FOR INJECTION

Kære patient

Du og dit behandlerteam har besluttet at påbegynde behandling af din prostatakrcft med PLUVICTO®.

Denne vejledning giver dig oplysninger om PLUVICTO® samt om, hvad du skal vide før, under og efter behandlingen.

Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning, skal du kontakte dit behandlerteam for yderligere support.

1. Hvad er PLUVICTO®, og hvordan virker det?

PLUVICTO® er en radioaktiv behandling (et radioaktivt lægemiddel), der bruges til at behandle voksne med progressiv kastrationsresistent prostatakrcæft, som har spredt sig til andre dele af kroppen (metastatisk), og som allerede er blevet behandlet med andre kræftbehandlinger

PLUVICTO® anvendes, hvis prostatakrcæftcellerne har et protein på deres overflade, kaldet prostataspecifik membranantigen (PSMA).

PLUVICTO® binder sig til PSMA, som findes på overfladen af prostatakrcæftcellerne. Når det er bundet, vil den radioaktive substans i PLUVICTO®, lutetium-177, udsende stråling, som får prostatakrcæftcellerne til at dø.

Din læge vil udføre tests for at se, om der er PSMA på overfladen af kræftcellerne. Det er mere sandsynligt, at din kræftsygdom reagerer på behandlingen med PLUVICTO®, hvis testresultatet er positivt.

Hvor længe varer behandlingen med PLUVICTO®?

PLUVICTO® gives ca. hver 6. uge i op til i alt 6 doser.

Hvordan foregår behandling med PLUVICTO®?

PLUVICTO® gives direkte i en vene.




2. HVAD BØR DU VIDE FØR, UNDER OG EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO®?

Behandling med PLUVICTO® indebærer eksponering for radioaktivitet.


Din læge og nuklearmedicineren har vurderet, at den kliniske fordel, som du vil opnå ved behandling med et radiofarmaceutisk lægemiddel, opvejer risikoen ved stråling.

Da dette lægemiddel er radioaktivt, skal du følge de anvisninger, der er beskrevet nedenfor, for at minimere strålingseksponeringen for andre, medmindre nuklearmedicineren har anvist andet.


Dit behandlersteam vil sørge for, at du er godt forberedt.



Før du får PLUVICTO®, skal du drikke rigeligt med vand, så du forbliver velhydreret, og kan lade vandet så ofte som muligt i de første timer efter, at du har fået lægemidlet.



Under behandlingen vil du opholde dig på afstand af andre patienter.



Når du har fået PLUVICTO®, skal du drikke rigeligt med vand i 2 dage for at forblive hydreret og lade vandet så ofte som muligt for at fjerne det radiofarmaceutiske lægemiddel fra kroppen

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO®

Følgende generelle anbefalinger for patienter kan overvejes sammen med nationale, lokale og institutionelle foreskrifter.

Kontakt med andre i din husstand, børn og/eller gravide kvinder

- Begræns tæt kontakt (under 1 meter) til:
 - andre i din husstand i 2 dage.
 - børn og gravide kvinder i 7 dage.
- Sov i et andet soveværelse end:
 - andre i din husstand i 3 dage.
 - børn i 7 dage.
 - gravide kvinder i 15 dage.
- Undgå seksuel aktivitet i 7 dage.
- Du må ikke gøre en kvinde gravid, og du skal bruge kondom under samleje gennem hele behandlingen med PLUVICTO® og i 14 uger efter din sidste dosis.



SÆRLIGE FORHOLDSREGLER EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO® (fortsat)

Brug af toiletter

Tag særlige forholdsregler for at undgå kontaminering i 2 dage efter behandlingen:

- Du skal altid sidde ned, når du går på toilettet.
- Det er vigtigt, at du bruger toiletpapir, hver gang du har været på toilettet.
- Vask altid hænder grundigt efter toiletbesøg.
- Skyl alle vådservietter og/eller toiletpapir ud i toilettet straks efter brug.
- Skyl alle papirservietter eller andre genstande, der indeholder noget fra din krop, såsom blod, urin og fæces, ud i toilettet. Genstande, der ikke kan skylles ud i toilettet, f.eks. bandager, skal placeres separate affaldsposer (i henhold til anbefalingen i punktet "Affaldshåndtering" nedenfor).
- Alt særligt medicinsk udstyr, som kan være forurenset med kropsvæsker (f.eks. kateterposer, stomiposer, bækkener, vanddyser), skal straks tømmes ud i toilettet og derefter rengøres.



SÆRLIGE FORHOLDSREGLER EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO® (fortsat)

Brusebad og tøjvask

- Tag brusebad hver dag i mindst 7 dage efter, at du har fået PLUVICTO®.
- Vask dit undertøj, pyjamas, lagner og alt tøj, der indeholder sved, blod eller urin på normal vis, men separat fra andet vasketøj fra andre i din husstand. Du behøver ikke at bruge blegemiddel, og vasketøjet behøver ikke ekstra skylninger.

Omsorgspersoner

2-3 dage efter behandlingen:

- Personer, der er sengeliggende eller har nedsat mobilitet, vil fortrinsvis få hjælp fra en omsorgsperson. Det anbefales, at omsorgspersoner bruger engangshandsker, når de hjælper dig på badeværelset.
- Omsorgspersoner, som tørrer opkast, blod, urin eller afføring op, skal bruge plastikhandsker, som skal bortskaffes i en separat affaldspose (se anbefalingen i punktet "Affaldshåndtering" nedenfor).



SÆRLIGE FORHOLDSREGLER EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO® (fortsat)

Affaldshåndtering

- Alle genstande, der skal kasseres, skal bortskaffes i en separat slettaffaldspose, der kun anvendes til dette formål.
- Opbevar affaldsposerne adskilt fra adskilt fra andet husholdningsaffald og utilgængeligt for børn og dyr.
- Hospitalspersonalet vil fortælle dig, hvordan og hvornår du skal bortskaffe disse affaldet.

Hospitalsindlæggelse og akut behandling

- Hvis du af en eller anden grund har brug for akut lægehjælp eller bliver uplanlagt indlagt på hospitalet i løbet af de første 7 dage efter din behandling, skal du oplyse sundhedspersonalet om navn, dato og og dosis af din radioaktive behandling.



SÆRLIGE FORHOLDSREGLER EFTER BEHANDLING MED PLUVICTO® (fortsat)

Andre forholdsregler

- Nuklearmedicineren vil informere dig om, hvorvidt du skal tage nogen særlige forholdsregler, efter at have fået dette lægemiddel. Kontakt nuklearmedicineren, hvis du har spørgsmål.



BIVIRKNINGER

Hvis du oplever bivirkninger, er det vigtigt at fortælle det til din læge. Du kan også rapportere bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via nedenstående information:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

NOTER

Godkendt af lægemiddelstyrelsen XX/YYYY
AAA-NP-GL-0369-22 | Version 1.0 | 10/22